

6.4. ORGANIZAREA PĂȘUNATULUI PENTRU DIFERITELE SPECII DE ANIMALE

Suprafețele care formează obiectul acțiunii de repartizare a pășunilor sunt pășunile propriu zise, fânețele folosite prin pășunat și suprafețele din fondul forestier lipsite de arborete sau cu consistență redusă, cu păduri degradate, în care crește iarbă consumabilă de animale. Beneficiarele ale acestor suprafețe sunt animalele crescătorilor din zonă, pentru care nu se poate asigura pășunatul pe suprafețele proprii.

În subzone de până la 1600 m, pentru repartizarea pajiștilor, este util să fie adoptate următoarele criterii:

-pășunile îmbunătățite, cele de tipul *Festuca rubra* (păiuș roșu), *Agrostis capillaris* (iarba câmpului) cu diverse specii mezofile, situate în partea inferioară a etajului fagului, cu forme de relief mai domoale, cu indici de producție superiori, cu surse de apă pentru adăpare cel puțin acolo unde se amplasează tabăra de vară și cu drumuri accesibile, să fie rezervate vacilor de lapte;

- pajiștile situate în etajul superior al fagului și în etajul molidului, cu unele condiții mai puțin prielnice dar care prin măsuri de întreținere și îmbunătățire pot asigura producții mari de iarbă, să fie repartizate pentru pășunatul tineretului bovin de prăsilă și pentru îngrășare;

- suprafețele situate pe terenuri cu relief mai frământat, dominate de ierburi mai puțin productive de tipul *Nardus stricta* (țăpoșică), care nu pot fi folosite cu randament de bovine, să fie repartizate pentru pășunatul ovinelor.

După definitivarea lucrărilor de repartizare a pajiștilor, este necesar ca acestea să fie consemnate într-un document cu următoarele mențiuni:

- denumirea trupului de pajiște repartizată, din ce corp face parte cu suprafață și delimitări;
- beneficiarul pajiștii repartizate;
- capacitatea de pășunat exprimată în UVM;
- numărul pe categorii al animalelor ce vor fi admise la pășunat pe pajiștea repartizată;
- perioada de timp pentru care s-a făcut repartizarea;
- lucrările de îmbunătățire, întreținere și folosire prevăzute a se aplica pe pajiștea respectivă, în cadrul programului de punere în valoare;
- sarcinile concrete ce revin beneficiarilor cu privire la lucrările ce trebuie să le aplice pe pajiștea repartizată în cursul anului pe date calendaristice.

Numărul și suprafața parcelelor de exploatare se stabilesc în funcție de producția lor, calitatea ierbii și posibilitatea regenerării ei. Ca suprafață, parcelele de exploatare pot diferi între ele, cu condiția ca producția de iarbă să fie aceeași și să suporte aceeași încărcătură de animale. În momentul în care capacitatea și calitatea furajelor de pe parcelă sunt ridicate, se pot face subparcele de folosire, în vederea eșalonării producției și valorificării raționale a furajului, cositul furajelor excedentare, pentru a asigura necesarul în cazul condițiilor nefavorabile. În mod normal, iarba se valorifică cu atât mai bine cu cât numărul parcelelor dintr-o tarla de pășunat este mai mare, întrucât se poate reduce durata medie a pășunatului și mări durata perioadei de refacere a ierbii. Modul de divizare a unei tarle în parcele, care face parte dintr-o unitate de exploatare (UE), este determinat de configurația terenului, de forma lui geometrică.

Ordinea de pășunat a parcelelor de exploatare este determinată de expoziție, altitudine și amplasare față de căile de acces. În general, parcelele cu o expoziție însorită și cu altitudinea cea mai mică se vor pășuna primele, după care se valorifică cele cu expoziție umbră sau situate la altitudini mai mari, rezultând calendarul de pășunat pe cicluri de exploatare. De asemenea se recomandă ca suprafețele aflate în imediata apropiere a localității să fie pășunate de vacile de lapte, iar tineretul bovin și celelalte categorii să utilizeze pajiștile mai îndepărtate.

Pentru delimitarea parcelelor de exploatare se vor folosi, pe cât posibil, limitele naturale, culmi, pâraie, drumuri, poteci, iar, unde acestea nu sunt prezente, se vor crea limite artificiale, preferabil garduri fixe din lemn, piatră, garduri vii sau electrice.

Gardurile fixe pot fi formate din stâlpi înalți de 1,5 m de la suprafața solului, depărtați între ei la 3-4m, pe care se fixează 3-4 rânduri de sârmă simplă, ghimpată sau plasă de sârmă. Gardurile interioare pot avea numai două rânduri de sârmă. Gardurile fixe sunt costisitoare și necesită lucrări permanente de întreținere. Gardurile electrice — cu păstor electric, reprezintă soluția cea mai bună pentru organizarea pășunatului pe tarlale. În interiorul tarlalelor se pot delimita suprafețe mai mici, pe care animalele să stea 1-2 zile sau doar o jumătate de zi.

Ritmul neuniform de repartizare a producției de iarbă pe pășuni face ca animalele să aibă de regulă un surplus de hrană la începutul pășunatului și să fie în criză la sfârșitul sezonului.

În condițiile unui pășunat pe tarlale, această problemă se poate rezolva mult mai ușor în sensul că o parte din tarlale (de exemplu 2 - 3 tarlale din 8 existente) la primul ciclu de pășunat producția excedentară se cosește pentru prepararea fânului sau însilozare. La fel se procedează și la ciclul doi de pășunat (1 - 2 tarlale din 8). Abia la ciclul al 3-lea și următoarele (4 - 6), producția pășunii se valorifică numai prin păscut cu animalele și completarea după caz pentru vacile de lapte cu furaje recoltate din primele cicluri de recoltă sau din afara pășunii.

Timpul de pășunat pe tarla prezintă de asemenea o importanță deosebită. Se cunoaște faptul că animalele erbivore reușesc, în câteva ore, să-și procure necesarul de hrană; în rest se plimbă bătătorind iarba și solul. De aceea este indicat să se pășuneze dimineața 3-4 ore, să se întrerupă pășunatul 2-4 ore (timp în care animalele se odihnesc și beau apă) și să se reia după-amiază de asemenea 3-4 ore.

Repartiția producției de iarbă într-o perioadă de pășunat este destul de neuniformă fiind mai mare la începutul spre mijlocul sezonului și mai mică la sfârșitul sezonului de pășunat. Din aceste considerente necesarul zilnic calculat de iarbă pentru o unitate de vită mare (UVM) în condițiile din țara noastră, de 50 kg, este bine să fie mărit cu cca 30 %, ajungând astfel la 65 kg iarbă pentru 1 UVM sau 13 kg substanță uscată (SU).

În cazul pășunatului rațional (când se face tarlalizarea) pajiștea se menține la un nivel productiv ridicat prin fertilizarea periodică, la fiecare 3-4 săptămâni cu îngrășăminte cu azot, în doze de 50-60 kg/ha N. În timpul administrării îngrășămintelor nu se întrerupe pășunatul. Excepție fac pajiștile care sunt sub angajament APIA. La acestea fertilizarea se va face în funcție de recomandările din pachetul accesat.

Avantajele sistemului rațional (în oricare din variante) de pășunat sunt:

- se limitează timpul petrecut de animale pe un anumit teritoriu;
- sporește producția pašunilor ca urmare a faptului că, după folosire, plantele au timp pentru refacere;
- ciclurile de pășunat determină o mai bună uniformizare a producțiilor în decursul perioadei de vegetație;
- înlăturarea pășunatului selectiv prin faptul ca animalele sunt obligate să consume toate speciile, atât pe cele valoroase cât și cele nevaloroase, ceea ce face ca procentul de buruieni să se reducă și deci să se îmbunătățească compoziția floristică a pajiștii;
- folosirea uniformă a întregii suprafețe de pășunat, nemaexistând suprafețe subpășunate (cu plante nevaloroase) sau suprapășunate (cu plante valoroase);
- sporește gradul de consumabilitate al plantelor;
- posibilitatea aplicării lucrărilor de îmbunătățire a pajiștilor, inclusiv fertilizare, irigare etc.;
- animalele nu distrug țelina și în consecință nu se declanșează fenomene erozionale;
- obținerea unor producții mai mari la animale (lapte, carne) prin faptul că au la dispoziție tot timpul furajul în cantitatea și de calitate corespunzătoare;
- prevenirea îmbolnăvirii animalelor de parazitoze pentru că în intervalul de 25-30 zile cât animalele lipsesc de pe tarla ouăle și larvele paraziților sunt omorâte de acțiunea razelor solare;
- posibilitatea grupării animalelor pe categorii omogene, ceea ce prezintă mari avantaje din punct de vedere tehnic, economic și organizatoric.

În teren – există suprafețe de pajiști utilizate ca pășuni care nu sunt întreținute corespunzător, sunt degradate și sărăcite prin suprapășunat, nu sunt curățite de plante toxice și dăunătoare, mai ales de ferigă, necosite de resturi de plante cu grad redus de consumabilitate, mai ales de târsă în zona de munte și pipirig în zonele de deal și lunci. Zonele neproductive cu tufărișuri de pe pârâurile și marginile de pădure, tind să se extindă spre interiorul pajiștilor, mai ales cu vegetație lemnoasă, care diseminează pe toată suprafața pășunilor învecinate. Neîntreținerea corespunzătoare a pășunilor duce și la extinderea zonelor cu eroziuni.

În zona de munte nu s-au făcut lucrări de întreținere, sunt parcele cu multă târsă, care trebuie îndepărtată, iar în alte parcele predomină afinișul, Calluna și/sau jnepenișul.

Unele parcele, mai ales de fâneață, sunt abandonate, necosite sau foarte puțin păscute. Foarte puține sunt fertilizate.

Alte parcele sunt păscute continuu de ovine, inclusiv în perioada de iarnă, fără timp de repaus pentru refacerea vegetației.

- Se recomandă curățirea repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, mai ales pe zonele fără pantă accentuată și eroziuni, oprirea înaintării în pășune a pădurii și zonelor cu tufăriș, cosirea vegetației cu grad redus de consumabilitate și a parcelelor nepăscute, nivelarea mușuroaielor în fiecare an, fertilizare anuală naturală sau chimică în funcție de sol și recomandări, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase, drenarea zonelor cu exces de umiditate, folosire organizată a pajiștii prin pășunat rațional, respectarea perioadei optime de târlire, revenire la cosirea fânețelor, cel puțin o dată pe an.

Pentru târsă și afiniș în zona de munte se recomandă distrugerea cu mulcerul, amendarea cu 2-5 t/ha CaCO₃, fertilizarea sau târlirea 2-3 nopți/mp/oaie și reînsămânțarea cu amestecuri de ierburi.

Pentru vegetația lemnoasă de pe pășune se cere acordul Ocolului silvic pentru curățirea și redare pășunatului, mai ales pentru arbori mari. Pomii fructiferi să fie curățiti și resturile lemnoase îndepărtate.

6.5. CĂI DE ACCES

La fiecare corp de pajiște trebuie să existe un drum de acces pe care să poată circula mijloace auto și mecanizate, ca să efectueze în bune condiții, în sezonul primăvară – vară - toamnă, toate transporturile necesare, inclusiv pentru mersul animalelor. De la drumul principal de acces la corpul de pajiști se vor deschide și amenaja drumuri în continuare, pe cât posibil la toate trupurile de pajiști, iar în interiorul fiecărui trup se vor amenaja drumuri sau căi de acces simple, până la adăposturile de animale, la stâne, la adăpători, depozite de furaje, silozuri etc. La proiectarea și execuția drumurilor pastorale se ține seama de unele criterii și anume:

- drumul să servească pe cât posibil mai multor scopuri: pastorale, forestiere, turistice etc.;
- să deservească și să ofere posibilități de acces la o cât mai mare suprafață de pajiști;
- să traverseze cât mai puține văi și pâraie, în vederea reducerii volumului lucrărilor de artă, poduri, podețe etc. și să evite complet locurile înmlăștinate;
- să fie pietruit, de la drumul de legătură până la corpul de pajiști și în interiorul acestuia cel puțin pe porțiunile cu pantă;
- să solicite un cost redus pe fiecare kilometru, spre a se putea cu aceleași investiții, în timp mai scurt, să se facă mai multe drumuri.

În teren – căile de acces la pajiștile din zona studiată pornesc de obicei din strazi, drumuri forestiere sau de exploatare, chiar din drum județean. Drumurile de acces la parcele sunt de pământ sau piatră, neîntreținute și greu accesibile în condiții meteo nefavorabile.

- Se recomandă repararea și întărirea drumurilor de acces la trupuri și parcele, cu pietriș tasat, completat de lucrări de îndepărtarea umidității acolo și orientarea apei pluviale unde este cazul.

6.6. CONSTRUCȚII ZOOPASTORALE ȘI SURSE DE APĂ

Pentru buna funcționare a amenajamentului pastoral sunt necesare mai multe construcții și dotări pentru sporirea gradului de accesibilitate, îmbunătățirea alimentării cu apă, adăpostirea oamenilor și animalelor, prelucrarea laptelui, energie electrică, împrejurare pentru târlire și pășunat rațional, depozitarea și aplicarea dejectiilor cât și alte utilități în consens cu dezvoltarea tehnicii și nivelului de civilizație.

Asigurarea cu apă de băut este o condiție indispensabilă pentru realizarea pășunatului rațional. Pentru fiecare kg de SU ingerată (5Kg MV) consumul zilnic de apă se ridică la 4-6 l la vacile de lapte 3-5 l la bovine la îngrășat și la 2-3 l la ovine și cabaline. De exemplu pentru o vacă care consumă 10 kg SU (50 Kg MV) trebuie să i se asigure 40-60 l apă. Pentru fiecare litru de lapte produs o vacă are nevoie de 4-6 l apă.

În general se socotește că 1 UVM în sezonul de pășunat are nevoie 30-40 litri apă/zi vara și de 15 - 20 litri în cursul primăverii și al toamnei. Pentru o oaie adultă se socotește 2 - 4 l/cap/zi în perioada pășunatului. Aprovizionarea cu apă se face din diferite surse, cu adăpători fixe sau mobile.

Înzestrarea pășunilor cu adăpători, este adesea dificilă, datorită debitelor insuficiente ale surselor de apă și calității necorespunzătoare a acestora. Dacă debitul sursei de apă este mai redus, cum este cazul unor izvoare de coastă, se poate construi un rezervor de apă care permite acumularea cantității de apă necesară animalelor aduse la pășunat. La fel se poate colecta în bazine apa din ploii de pe acoperișurile adăposturilor de animale sau a caselor de locuit, prevăzute cu jgheaburi și țevi de colectare. În zonele lipsite de izvoare în care apa curge gravitațional se pot săpa puțuri și fântâni cu cumpănă sau pompe acționate manual, cu energie mecanică, electrică, eoliană, etc. care se dirijează direct în jgheaburile de adăpare sau bazine de rezervă pentru același scop.

Adăpătorii fixe trebuie să fie amplasați la maximum 800 m de locul unde se pășunează și în jurul lor sunt necesare lucrări de eliminare a excesului de umiditate.

Lungimea jgheaburilor de adăpare (L) se calculează în funcție de numărul de animale (N) în așa fel încât adăparea unei grupe de animale să nu dureze mai mult de o oră:

$$L = \frac{Nts}{T}$$

t = timpul necesar pentru adăparea unui animal (minute)

s = frontul de adăpare pentru un animal (m)

T = timpul necesar pentru adăparea întregului efectiv de animale (maxim 60 minute).

Unele date necesare pentru calculul lungimii adăpătorilor:

Specia și categoria de animale	Necesar zilnic de apă	Timp necesar adăpării unui animal (minute)	Frontul de adăpare (m) când adăpatul se face:	
			Pe ambele laturi	Pe o singură latură
Bovine și cabaline adulte	40-50	7-8	0,5	1,2
Tineret taurin și cabalin	20-30	5-6	0,4	1,0
Oi și capre adulte	4-5	4-5	0,2	0,5
Tineret ovin	2-3	4-5	0,2	0,5

Soluția cea mai bună o constituie adăpătorile automate cu nivel constant, unde pierderile de apă sunt minime.

O mare atenție trebuie acordată locurilor de adăpare a animalelor care pot să fie focare de răspândire a helmintozelor (gălbezei). În acest scop este necesară curățirea și dezinfectarea lunară a adăpătorilor cu lapte de var. Terenul din jurul adăpătorilor se va menține uscat prin pavare și asigurarea scurgerii apelor în surplus.

În cazul captării izvoarelor, fie că acesta este unul singur sau sunt mai multe pe același loc, în partea lor din aval se face un baraj în spatele căruia se adună apa ce este apoi condusă la jgheaburi, la intermediar se construiește un recipient de captare, simplu sau cu un decantor.

Bazinul de apă, casa de apă sau recipientul de captare, atât în cazul aducerii apei din pâraie cât și direct de la izvoare, se construiește din lemn îmbinat, din piatră cu mortar de ciment sau din beton, pietruit sau betonat pe fund și margini și acoperit cu blăni de lemn, cu lespezi de piatră sau cu plăci de beton. Din recipient la jgheaburi, conducerea apei se face prin țevi de fier sau zincate, sau tuburi din plastic cu diametrul de 1-2 țoli (25,5-51 mm).

În teren – există unele adăposturi de animale vechi sau refacute din lemn, pe pasuni, iar pe unele fanete sunt locuințele de vară ale oamenilor. Majoritatea parcelelor, mai ales cele mai îndepărtate de localități, sunt păscute de ovine, au și adăposturi locale – stâne.

Adăparea se realizează direct din pârauri sau izvoare cu debit continuu colectate în adăpători improvizate din lemn sau vechi din beton; în jurul adăpătorilor terenul începe să se degradeze, cu exces de umiditate și bătătorire, ceea ce duce la îngreunarea adăpatului, murdărirea animalelor și chiar infectarea zonei cu diferiți paraziți.

- Se recomandă – refacerea adăposturilor vechi pentru animale;
- construcția unor adăpători de beton conform normelor, dezinfectarea lor periodică, eliminarea excesului de umiditate și pavarea cu pietriș a zonei din jurul lor. Pentru buna funcționare a adăpătorilor, în fiecare primăvară, acestea să fie revăzute, reparate și întreținute în tot timpul verii iar paznicii de animale au obligația de a curăța jgheaburile, cel puțin o dată pe săptămână.

)

)

7. DESCRIERE PARCELARĂ

a. Păjiști care aparțin Consiliului Local:

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Între Păduri – Cisnădioara (4)	Pș 402	3,26	Pășune mixtă	Luncă	Neuniformă
Altitudine: 490-505m Expoziție: V, NV Înclinație: 3-5° Sol: Preluvosol stagnogleizat moderat						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere pădure și tufăriș de pe râul Seviș						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
40 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 10%, <i>Anthoxanthum odoratum</i> 10%, 5% alte graminee (<i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Festuca pratensis</i> , <i>Festuca rupicola</i> ...)						
15 % Leguminoase: <i>Medicago sp.</i> 8%, <i>Lotus sp.</i> 5%, <i>Trifolium sp.</i> 2%						
10% Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 3%, <i>Rhinanthus minor</i> 2%, <i>Stachys sp.</i> 2%, <i>Daucus carota</i> 2%, 1% alte plante (<i>Plantago sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Viola sp.</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> ...)						
Plante dăunătoare și toxice –						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,8 bovine/ha sau 4 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha (producție masă verde 15-20 t/ha)						
35 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure cu <i>Robinia pseudoaccacia</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus avellana</i> medii și mari; extindere vegetație râu și diseminări cu <i>Alnus sp.</i> , <i>Populus sp.</i> , <i>Salix sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rubus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> ...)						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg+ <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (4 t/ha Ca CO ₃ , 160 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratărlit sau cosit cel puțin o dată pe an; amenajare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Între păduri – Cisnădioara (4)	Pș 404	0,06	Pș împădurită	Deal	Neuniform
Alitudine: 515 m		Expoziție: NE	Inclinație: 0-3°	Sol: Luvosol albic		
Datele staționale suplimentare: împădurit 08 din extindere pădure						
Tipul de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase:						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
100 % Vegetația lemnoasă: <i>Quercus sp.</i> peste 15 ani, mai mult de 15 m înălțime						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: propunere de includere în Amenajament silvic						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Între Păduri – Cisnădioara (4)	Pș 406 a	~28,00	Pășune mixtă	Luncă	Neuniformă
Alitudine: 505-535m		Expoziție: N	Inclinație: 5-15°	Sol: Luvosol tipic; Luvosol albic		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere pădure și tufăriș în zona drumurilor; vetre de cuscută						
Tip de pajiște: <i>Holcus lanatus</i> cu <i>Festuca sp. (rubra, pratensis, rupicola...)</i>						
50 % Graminee: <i>Holcus lanatus</i> 15%, <i>Festuca sp. (rubra, pratensis, rupicola...)</i> 15%, <i>Agrostis tenuis</i> 10%, <i>Bromus sp.</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> ...)						
15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 7%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 3%, <i>Cytisus sp.</i> 2%...						
30 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 10%, <i>Plantago sp.</i> 7%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Ranunculus sp.</i> 3%, <i>Rhinanthus minor</i> , <i>Daucus carota</i> 2%, 5% alte plante (<i>Prunella sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Erigeron sp.</i> ...)						
Plante dăunătoare și toxice: <i>Cuscuta campestris</i> , <i>Hypericum perforatum</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei – 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,8 bovine/ha sau 4 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1,2 bovine/ha sau 6-6,2 ovine/ha (producție masă verde 20-25 t/ha)						
5 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure cu <i>Quercus sp.</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus avellana</i> mari; extindere tufăriș și diseminări rare cu <i>Robinia pseudoaccacia</i> , <i>Salix sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rubus sp.</i>						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg+ <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (3 t/ha Ca CO ₃ , 160-170 kg/ha N, 45-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 30-80 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratărlit sau cosit cel puțin o dată pe an; amenajare și întreținere drumuri de exploatație.						
- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Între Păduri (4) Cisnădioara	Pș 406 b	~11,61	Pășune mixtă	Luncă	Neuniformă
Altitudine: 520-565m		Expoziție: N	Înclinație: 15-30°	Sol: Luvosol albic		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere pădure și diseminări tufărișuri; vetre de cuscută; zone cu ferigă și mușuroaie vechi înțelenite						
Tip de pajiște: <i>Agrostis lanatus</i> cu <i>Festuca sp. (rubra, rupicola...)</i>						
30 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 10%, <i>Festuca sp. (rubra, rupicola...)</i> 10%, <i>Holcus lanatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Bromus sp.</i> , <i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Deschampsia chaespitosa...</i>)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Medicago sp.</i> 2%, <i>Lotus sp.</i> 2%, <i>Cytisus sp.</i> 1%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 10%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, 2% alte plante (<i>Prunella sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Rhinanthus minor</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Erigeron sp...</i>)						
10 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Cuscuta campestris</i> , <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Pteridium sp...</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,5-0,7 bovine/ha sau 3-4 ovine/ha (producție masă verde 5-7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha (producție masă verde 15-20 t/ha)						
30 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure cu <i>Quercus sp.</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus avellana</i> mari; diseminări tufăriș cu <i>Prunus spinosa</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rubus sp...</i> medii și mici						
Lucrări executate: -						
<p>Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni și arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg+ <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (3 t/ha Ca CO₃, 160 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 80 kg/ha K₂O); evitare suprapășunat și supratărlit sau cosit cel puțin o dată pe an; amenajare și întreținere drumuri de exploatație.</p> <p>- <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.</p>						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Stupul Cisnădiei - Greverei (14)	Pș 1010	0,42	Pășune bovine	Luncă	Uniformă
Altitudine: 472-480m		Expoziție: N	Înclinație: 0-3°	Sol: Gleiosol calcaric		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere tufărișuri și albie râu Seviș; drum de exploatare dublat pe timp umed						
Tip de pajiște: <i>Agrostis lanatus</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
35 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 10%, <i>Holcus lanatus</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, rubra...)</i> 5%, <i>Agropyron repens</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Bromus sp.</i> , <i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Anthoxanthum odoratum...</i>)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 10%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Taraxacum sp.</i> 3%, 2% alte plante (<i>Prunella sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Rhinanthus minor</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Erigeron sp...</i>)						
Plante dăunătoare și toxice: <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Euphorbia cyparissias...</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 85%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha (producție masă verde 15-20 t/ha)						
20 % Vegetația lemnoasă: extindere tufăriș cu <i>Salix sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rubus sp...</i> medii, mici și diseminări cu <i>Prunus spinosa</i> , <i>Crataegus monogyna</i> mici						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg+ <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (160 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 70 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; amenajare și întreținere drumuri de exploatație.						
- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Stupul Cisnădiei - Greverei (14)	Pș 1011	4,53	Pășune mixtă	Luncă	Uniformă
Altitudine: 475-493m Expoziție: N Înclinație: 0-5° Sol: Preluvosol tipic 0,40 ha; Preluvosol stagnogleizat 1,20 ha; Luvosol stagnogleizat 2,86 ha						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere tufăriș în zona pâraurilor; zone cu eroziuni de suprafață						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 25%, <i>Holcus lanatus</i> 15%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Bromus sp.</i> , <i>Festuca sp. -rubra, pratensis, rupicola-</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Dactylis glomerata</i> ...)						
20 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 7%, <i>Lotus sp.</i> 3%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 7%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Daucus carota</i> 2%, 5% alte plante (<i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Rhinanthus minor</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Erigeron sp.</i> ...)						
Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,8 bovine/ha sau 4 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1,2 bovine/ha sau 6-6,2 ovine/ha (producție masă verde 20-25 t/ha)						
10 % Vegetația lemnoasă: extindere tufăriș și diseminări rare cu <i>Salix sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> medii, mari și diseminări mici de <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> ...						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg+ <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha Ca CO ₃ , 120-170 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-75 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; amenajare și întreținere drumuri de exploatație.						
- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuritul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Stupul Cisnădiei - Greverei (14)	Pș 1014	12,63	Pășune mixtă	Luncă	Uniformă
Altitudine: 477-495m Expoziție: N Înclinație: 0-5° Sol: Faeoziom cambic stagnic 3,10 ha; Preluvosol stagnogleizat 0,80 ha; Luvosol stagnogleizat 8,73 ha						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere tufăriș în zona pâraurilor; zone cu eroziuni de suprafață						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 25%, <i>Holcus lanatus</i> 15%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Bromus sp.</i> , <i>Festuca sp. -rubra, pratensis, rupicola-</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Dactylis glomerata</i> ...)						
20 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 7%, <i>Lotus sp.</i> 3%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 7%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Daucus carota</i> 2%, 5% alte plante (<i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Rhinanthus minor</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Erigeron sp.</i> ...)						
Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,8 bovine/ha sau 4 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1,2 bovine/ha sau 6-6,2 ovine/ha (producție masă verde 20-25 t/ha)						
10 % Vegetația lemnoasă: extindere tufăriș și diseminări rare cu <i>Salix sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> medii, mari și diseminări mici de <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> ...						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg+ <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha Ca CO ₃ , 110-170 kg/ha N, 45-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 70-75 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratărlit sau cosit cel puțin o dată pe an; amenajare și întreținere drumuri de exploatație.						
- cu <u>angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Stupul Cisnădiei - Greverei (14)	Tf 1016; Tf 1019; Tf 1022	1,42; 0,36; 0,79	Tufărișuri	Deal	Neuniform
Altitudine: 485-540 m Expoziție: V, SV Înclinație: 3-10° Sol: Faeoziom argic stagnogleizat						
Datele staționale suplimentare: tufărișuri de delimitare tarlale; tendință de extindere prin diseminare						
Tipul de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase:						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
100 % Vegetația lemnoasă: <i>Carpinus betulus</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Salix sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp...</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: păstrare ca și perdele de protecție împotriva vântului, cu oprirea înaintării în parcelele vecine și curățare ceea ce s-a extins deja, pentru redare pășunatului; curățire vegetație lemnoasă tăiată, nivelare, fertilizare și însămânțare (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 10 kg + <i>Festuca pratensis</i> 8 kg + <i>Phleum pratense</i> 5 kg+ <i>Lolium perenne</i> 2 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 3 kg).						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Stupul Cisnădiei - Greverei (14)	Pș 1017; Pș 1020	0,19; 0,36	Pășune mixtă	Deal	Uniform
Altitudine: 535 m Expoziție: S, SV Înclinație: 0-5° Sol: Faeoziom tipic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere tufăriș; drumuri de exploatare dublate pe timp umed						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
45 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 20%, <i>Holcus lanatus</i> 15%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Bromus sp.</i> , <i>Festuca sp. -rubra, pratensis, rupicola-</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Dactylis glomerata</i> ...)						
20 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 7%, <i>Lotus sp.</i> 3%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 7%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Daucus carota</i> 2%, 5% alte plante (<i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Rhinanthus minor</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Erigeron sp...</i>)						
Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,5-0,7 bovine/ha sau 3-4 ovine/ha (producție masă verde 5-7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha (producție masă verde 15-20 t/ha)						
15 % Vegetația lemnoasă: extindere tufăriș și diseminări rare cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> medii, mari și diseminări mici de <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> ...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg+ <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (120 kg/ha N, 30 kg/ha P ₂ O ₅ , 45 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratărlit sau cosit cel puțin o dată pe an; amenajare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Stupul Cisnădiei - Greverei (14)	Pș 1023; Pș 1025	0,52; 23,86	Pășune ovine	Deal	Neuniform
Altitudine: 480-545m Expoziție: V Înclinație: 5-20° Sol: Gleiosol aluvic 0,52 ha; Faeoziom cambic stagnic 2,70 ha; Faeoziom argic stagnogleizat 17,16 ha; Preluvosol tipic 4,80 ha						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere tufăriș de pe pârâuri; diseminări de arbuști mici și rare exmplare de mesteacăn mari; zone cu pipirig; zone cu eroziuni de suprafață; deumuri de exploatare dublate pe timp umed						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
45 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, rubra, pratensis)</i> 5%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, <i>Deschampsia chaespitosa</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Bromus sp., Anthoxanthum odoratum, Phleum pratense...</i>)						
15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Juncus sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Daucus carota, Centaurea sp., Stellaria sp., Ranunculus sp., Carex sp., Rhinanthus minor, Agrimonia eupatoria, Galium sp., Cichorium intybus, Rumex sp., Erigeron sp...</i>)						
5 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp., Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias...</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,8 bovine/ha sau 4 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1,2 bovine/ha sau 6-6,2 ovine/ha (producție masă verde 20-25 t/ha)						
15 % Vegetația lemnoasă: 5% extindere tufăriș cu <i>Salix sp., Betula sp., Corylus avelana, Crataegus monogyna, Prunus spinosa</i> medii și mari; 10% diseminări dese cu <i>Crataegus monogyna, Prunus spinosa</i> mici; diseminări rare de <i>Betula sp.</i> medii, mari						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie, curățire și târlire parțială						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni și arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; <i>Deschampsia sp.</i> și <i>Juncus sp.</i> nu sunt plante valoroase pentru hrana animalelor, trebuie curățite (se poate face cu mulcerul); îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (110-150 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-75 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârlit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Sibiului – Trup I – trup V (16)	Tf 1120; Tf 1122; Tf 1125; Tf 1164	1,35; 1,44; 0,18; 0,74	Tufărișuri	Luncă; Deal	Neuniform
Altitudine: 455-465m; 530-550m Expoziție: N Înclinație: 1-10° Sol: Preluvosol stagnogleizat 2,97 ha; Preluvosol tipic 0,74 ha						
Datele staționale suplimentare: tufărișuri de delimitare tarlale și pârâu; tendință de extindere prin diseminare						
Tipul de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase:						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
100 % Vegetația lemnoasă: <i>Carpinus betulus</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Salix sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp...</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: păstrare ca și perdele de protecție împotriva vântului, cu oprirea înaintării în parcelele vecine și curățare ceea ce s-a extins deja, pentru redare pășunatului; curățire vegetație lemnoasă tăiată, nivelare, fertilizare și însămânțare (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 10 kg + <i>Festuca pratensis</i> 8 kg + <i>Phleum pratense</i> 5 kg+ <i>Lolium perenne</i> 2 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 3 kg).						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Dealul Sibiului – Trup I – trup V (16)	Pș 1123; Pș 1124	0,87; 15,94	Pășune ovine și bovine	Luncă	Neuniformă
Altitudine: 455-480m Expoziție: N Înclinație: 3-15° Sol: Preluvosol stagnogleizat						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere tufăriș de pe pârâuri; diseminări de arbuști mici și medii; zone cu exces de umiditate și pipirig – tendință de împânzire; zone cu eroziuni de suprafață; mușuroaie vechi înțelenite; bazine de beton vechi, neîntreținute						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
45 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 10%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, <i>Festuca sp. (rupicola, rubra)</i> 5%, <i>Deschampsia chaespitosa</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Bromus sp.</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Agropyron repens</i> ...)						
15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 7%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Juncus sp.</i> 5%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Daucus carota</i> 2%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Rhinanthus minor</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Veronica sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Erigeron sp.</i> ...)						
5 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , rar <i>Carduus sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6-0,8 bovine/ha sau 3-4 ovine/ha (producție masă verde 6-8 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1,2 bovine/ha sau 6-6,2 ovine/ha (producție masă verde 20-25 t/ha)						
15 % Vegetația lemnoasă: 5% extindere tufăriș cu <i>Salix sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> medii și mari; 10% diseminări dese cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici; diseminări rare de <i>Betula sp.</i> medii, mari						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; <i>Deschampsia sp.</i> și <i>Juncus sp.</i> nu sunt plante valoroase pentru hrana animalelor, trebuie curățite (se poate face cu mulcerul); îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; desecare zone cu exces de umiditate; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (3 t/ha CaCO ₃ , 150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 80 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; construire adăpătoare după standarde, întreținere și dezinfectare periodică adăpătoare și zona din jur; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație; - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Dealul Sibiului – Trup I – trup V (16)	Pș 1127; Pș 1128; Pș 1129	2,89; 1,89; 2,75	Pășune ovine	Deal	Neuniform
Altitudine: 480-520m Expoziție: N Înclinație: 10-25° Sol: Preluvosol tipic 4,44 ha, Preluvosol stagnogleizat 3,09 ha						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere tufăriș de pe pârâuri; diseminări de arbuști mici și medii; zone cu pipirig; zone cu eroziuni de suprafață						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
40 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 8%, <i>Festuca sp. (rupicola, rubra)</i> 7%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> , <i>Agropyron repens</i>)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 7%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Daucus carota</i> 2%, 5% alte plante (<i>Juncus sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Rhinanthus minor</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp.</i> ...)						
5 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Pteridium sp.</i> , <i>Carduus</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,5-0,7 bovine/ha sau 3-4 ovine/ha (producție masă verde 5-7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha (producție masă verde 15-20 t/ha)						
25 % Vegetația lemnoasă: 5% extindere tufăriș de pe pârâu cu <i>Salix sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Corylus avelana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> medii și mari; 10% diseminări dese cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici; diseminări rare de <i>Betula sp.</i> medii, mari						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie, curățire parțială						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; <i>Deschampsia sp.</i> și <i>Juncus sp.</i> nu sunt plante valoroase pentru hrana animalelor, trebuie curățite (se poate face cu mulcerul); îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-2 t/ha CaCO ₃ , 120-150 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-80 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratărlit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație - cu <u>angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Dealul Sibiului – Trup I – trup V (16)	Pș 1130; Pș 1165; Pș 1167/2	1,92; 21,47; 0,97	Pășune ovine	Deal	Neuniform
Altitudine: 520-550m Expoziție: N Înclinație: 10-35° Sol: Faeoziom argic vertic 1,00 ha; Preluvosol tipic 10,07 ha, Luvosol stagnogleizat 6,90 ha						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): zona Valenberg; diseminări de arbuști mici și medii; extindere vegetație lemnoasă de pe pârâu; zone cu pipirig; zone cu eroziuni de suprafață						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, rubra)</i> 10%, <i>Cynosurus cristatus</i> 10%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> , <i>Agropyron repens</i>)						
15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 7%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Juncus sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Rhinanthus minor</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Carduus sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6-0,8 bovine/ha sau 4 ovine/ha (producție masă verde 6-8 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha (producție masă verde 20-25 t/ha)						
15 % Vegetația lemnoasă: 10% diseminări dese cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici; 5% extindere tufăriș de pe pârâu cu <i>Salix sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> medii și mari;						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie, curățire parțială						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; <i>Deschampsia sp.</i> și <i>Juncus sp.</i> nu sunt plante valoroase pentru hrana animalelor, trebuie curățite (se poate face cu mulcerul); îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-2 t/ha CaCO ₃ , 110-150 kg/ha N, 35-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60-80 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatare - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Dealul Sibiului – Trup I – trup V (16)	Pș 1131; Pș 1132	10,12; 3,55	Pășune ovine	Deal	Neuniform
Altitudine: 490-550m Expoziție: N Înclinație: 5-20° Sol: Faeoziom argic vertic 0,80 ha; Faeoziom argic stagnogleizat 1,40 ha, Preluvosol tipic 3,40 ha, Preluvosol stagnogleizat 0,50 ha, Luvosol tipic 2,30 ha, Luvosol albic 6,35 ha						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): fermă; diseminări de arbuști mici și medii; extindere vegetație lemnoasă de pe pârâu; zone cu eroziuni de suprafață datorate trecerii animalelor						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Agropyron repens</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Agropyron repens</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, rubra)</i> 10%, <i>Holcus lanatus</i> 5%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Poa annua</i> ..)						
15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
25 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 10%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Taraxacum sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,8-1 bovine/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha (producție masă verde 20-25 t/ha)						
10 % Vegetația lemnoasă: diseminări cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici; extindere tufăriș de pe pârâu cu <i>Salix sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> medii și mari						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie, curățire						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-2 t/ha CaCO ₃ , 110-170 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 30-80 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; construire adăpătoare după standarde, întreținere și dezinfectare periodică adăpătoare și zona din jur; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Dealul Sibiului – Trup I – trup V (16)	Pș 1133; Pș 1134; Pș 1135	12,26; 2,02; 4,66	Pășune ovine	Deal	Neuniform
Altitudine: 485-510m Expoziție: N Înclinație: 5-15° Sol: Faeoziom argic stagnogleizat 1,70 ha, Preluvosol tipic 5,40 ha, Luvosol tipic 3,20 ha, Luvosol stagnogleizat 3,26 ha; Luvosol albic 5,32 ha						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): diseminări de arbuști mici și medii; zone cu pipirig; zone cu eroziuni de suprafață datorate trecerilor de animale						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, rubra)</i> 10%, <i>Cynosurus cristatus</i> 10%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> , <i>Agropyron repens</i>)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
25 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 10%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Juncus sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Ranunculus-sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Rhinanthus minor</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6-0,8 bovine/ha sau 4 ovine/ha (producție masă verde 6-8 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha (producție masă verde 20-25 t/ha)						
15 % Vegetația lemnoasă: diseminări dese cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici, rar medii						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie, curățire parțială						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; <i>Deschampsia sp.</i> și <i>Juncus sp.</i> nu sunt plante valoroase pentru hrana animalelor, trebuie curățite (se poate face cu mulcerul); îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 120-170 kg/ha N, 30-70 kg/ha P ₂ O ₅ , 30-80 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea pășcutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație						
- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Dealul Sibiului Trup I – trup V (16)	Pș 1136 a	~47,00	Pășune ovine	Deal	Neuniform
Altitudine: 475-545m Expoziție: N, NV Înclinație: 5-20° Sol: Faeoziom cambic stagnic 2,20 ha, Faeoziom argic vertic 5,07 ha, Faeoziom argic stagnogleizat 1,40 ha, Preluvosol tipic 17,10 ha, Preluvosol stagnogleizat 6,50 ha, Luvosol tipic 2,90 ha, Luvosol stagnogleizat 2,80 ha, Luv. albic 9,90 ha						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): diseminări de arbuști mici; zone transformate din pășune împădurită curățată în timp; zone cu eroziuni de suprafață datorate trecerii animalelor						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Agropyron repens</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Agropyron repens</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, rubra)</i> 10%, <i>Holcus lanatus</i> 5%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Poa annua</i> ..)						
15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Taraxacum sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp.</i> ..)						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6-0,8 bovine/ha sau 3-4 ovine/ha (producție masă verde 6-8 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha (producție masă verde 20-22 t/ha)						
5 % Vegetația lemnoasă: diseminări cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie, curățire						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 110-170 kg/ha N, 30-80 kg/ha P ₂ O ₅ , 30-80 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; construire adăpătoare după standarde, întreținere și dezinfectare periodică adăpătoare și zona din jur; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Sibiului – Trup I – trup V (16)	Pș 1136 b; Pșpd 1139; Pșpd 1142; Pșpd 1143	~11,10; 0,02; 0,07; 0,58	Tufărișuri	Deal	Neuniform
Altitudine: 475-520m Expoziție: N Inclinație: 5-10° Sol: Preluvosol stagnogleizat 3,50 ha, Luvosol tipic 6,00 ha, Gleiosol aluvic 1,60 ha						
Datele staționale suplimentare: tufărișuri de pe pârâu cu tendință de extindere spre parcelele vecine						
Tipul de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase:						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
100 % Vegetația lemnoasă: pe pârâu <i>Alnus sp.</i> , <i>Salix sp.</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> ; diseminări de <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă cu acord Ocol silvic pentru vegetație silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii, cu oprirea înaintării în parcelele vecine și curățarea diseminărilor, pentru redare pășunatului; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată, nivelare, fertilizare și însămânțare (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 10 kg + <i>Festuca pratensis</i> 8 kg + <i>Phleum pratense</i> 6 kg+ <i>Lolium perenne</i> 2 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 3 kg).						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Dealul Sibiului – Trup I – trup V (16)	Pș 1140	4,60	Pășune ovine	Deal	Neuniform
Altitudine: 480-515m		Expoziție: N	Înclinație: 10-20°		Sol: Preluvosol tipic	
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere tufăriș de pe pârâu; diseminări de arbuști mici și medii; zone cu pipirig						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Festuca sp. (rupicola, rubra)</i>						
30 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, rubra)</i> 5%, <i>Holcus lanatus</i> 5%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> , <i>Agropyron repens</i>)						
5 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> , <i>Medicago sp.</i> , <i>Lotus sp.</i>						
15 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, 4% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,1-0,3 bovine/ha sau 2 ovine/ha (producție masă verde 1-3 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha (producție masă verde 15-20 t/ha)						
50 % Vegetația lemnoasă: 40% diseminări dese cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici; 10% extindere tufăriș de pe pârâu cu <i>Salix sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> medii și mari						
Lucrări executate: -						
<p>Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; <i>Deschampsia sp.</i> și <i>Juncus sp.</i> nu sunt plante valoroase pentru hrana animalelor, trebuie curățite (se poate face cu mulcerul); îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (120 kg/ha N, 40 kg/ha P₂O₅, 40 kg/ha K₂O); evitare suprapășunat și supratărlit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație</p> <p>- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.</p>						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Cisnădioara Trup I – trup III (39)	Np 2690; Np 2691	0,10; 0,25	Taluzuri	Deal	Uniform
Altitudine: 530-540m		Expoziție: S, SE	Înclinație: 5-15°	Sol: Aluvisol eutric		
Datele staționale suplimentare: taluzuri la drum						
Tipul de pajiște: -						
20 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 5%, <i>Festuca sp. (rupicola, rubra)</i> 5%, <i>Agropyron repens</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Cynosurus cristatus</i> ...)						
% Leguminoase: <i>Trifolium repens</i> ...						
10 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 3%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Taraxacum sp.</i> 2%, 2% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
70 % Vegetația lemnoasă: <i>Carpinus betulus</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> ; diseminări de <i>Pinus sp.</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: păstrare protecție împotriva eroziunii, cu oprirea înaintării în parcelele vecine și curățarea diseminărilor						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Cisnădioara Trup I – trup III (39)	Tf 2698/1	1,33	Tufărișuri	Luncă	Uniformă
Altitudine: 545-565m		Expoziție: N, NV	Înclinație: 5-10°		Sol: Aluvisol eutric	
Datele staționale suplimentare: fâșie împădurită și extindere vegetație lemnoasă de pe pârâu						
Tipul de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase:						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
100 % Vegetația lemnoasă: pe pârâu <i>Alnus sp.</i> , <i>Salix sp.</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> ...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă cu acord Ocol silvic pentru vegetație silvică, pentru redare pășunatului; păstrare protecție împotriva eroziunii, cu oprirea înaintării în parcelele vecine; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată, nivelare, fertilizare și însămânțare (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 10 kg + <i>Festuca pratensis</i> 8 kg + <i>Phleum pratense</i> 6 kg+ <i>Lolium perenne</i> 2 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 3 kg).						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Cisnădioara Trup I – trup III (Valea Argintului - 39)	Pș 2692; Np 2703/1; Pș 2703/2; Pș 2704; Pș 2706; Pș 2707; Pș 2708; Pș 2714	0,20; 0,25; 0,15; 0,03; 0,47, 0,13; 0,19; 0,11	Pășune ovine	Luncă	Neuniformă
Altitudine: 550-585m		Expoziție: S, SE	Înclinație: 0-10°		Sol: Aluvisol eutric 1,34 ha, Aluvisol eutric entic litic 0,19 ha	
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere tufăriș de pe pârâu; zone cu focare pentru grătare; zone cu pipirig; zone cu diseminări de vegetație lemnoasă						
Tip de pajiște: Agrostis tenuis cu Agropyron repens						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Agropyron repens</i> 15%, <i>Festuca sp. (rupicola, rubra)</i> 10%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Holcus lanatus</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> , <i>Bothriochloa ischaemum</i> ...)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Lotus sp.</i> 3%, <i>Medicago sp.</i> 2%...						
13-18 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Taraxacum sp.</i> 3%, 2-7% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Cichorium intybus</i> ...)						
2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Eryngium campestre</i> , <i>Carduus sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,5-0,7 bovine/ha sau 3 ovine/ha (producție masă verde 5-7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha (producție masă verde 15-20 t/ha)						
20-25 % Vegetația lemnoasă: 15-20% extindere tufăriș de pe pârâu și pădure cu <i>Salix sp.</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus avelana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Rubus sp.</i> medii și mari; diseminări cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică și redare pășunatului, cu pastrare de arbori izolați sau grupurile de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (150 kg/ha N, 30-50 kg/ha P ₂ O ₅ , 55-85 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratărlit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea pășcutului pe timp umed						
- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Cisnădioara Trup I – trup III (VI. Argintului - 39)	Tf 2715; Tf 2717; Tf 2719; Tf 2720; Tf 2722	0,41; 0,35; 0,60; 0,04; 0,56	Tufărișuri	Luncă	Uniformă
Alitudine: 545-565m		Expoziție: N, NV	Inclinație: 5-10°	Sol: Aluvisol eutric		
Datele staționale suplimentare: fâșie împădurită și extindere vegetație lemnoasă de pe pârâu						
Tipul de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase:						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
100 % Vegetația lemnoasă: pe pârâu <i>Alnus sp.</i> , <i>Salix sp.</i> ; din pădure <i>Carpinus betulus</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> ...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă cu acord Ocol silvic pentru vegetație silvică, pentru redare pășunatului; păstrare protecție împotriva eroziunii, cu oprirea înaintării în parcelele vecine; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată, nivelare, fertilizare și însămânțare (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 10 kg + <i>Festuca pratensis</i> 8 kg + <i>Phleum pratense</i> 6 kg+ <i>Lolium perenne</i> 2 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 3 kg).						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Cisnădioara Trup I – trup III (VI. Luminoasă - 39)	Pșpd 2723; Tf 2728; Pș 2759 b	8,12; 0,73; ~13,50	Pș împădurită, tufărișuri	Deal	Neuniform
Alitudine: 540-630m		Expoziție: N, NV	Inclinație: 5-25°	Sol: Preluvsol tipic 16,32 ha; Luvosol tipic 24,53 ha; Luvosol stagnogleizat 3,62 ha		
Datele staționale suplimentare: împădurită prin extindere pădure, consistență peste 04						
Tipul de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase:						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
100 % Vegetația lemnoasă: <i>Carpinus betulus</i> , <i>Quercus sp.</i> , <i>Pinus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> ...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: introducerea în Amenajament silvic sau curățire vegetație lemnoasă cu acord Ocol silvic pentru vegetație silvică, pentru redare pășunatului; păstrare protecție împotriva eroziunii, cu păstrarea arbori izolați sau grupurile de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată, nivelare, fertilizare și însămânțare (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 10 kg + <i>Festuca pratensis</i> 8 kg + <i>Phleum pratense</i> 6 kg+ <i>Lolium perenne</i> 2 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 3 kg).						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Cisnădioara Trup I – trup III (După Ștrand - 39)	Tf 2735; Tf 2736; Tf 2737;	0,07; 0,03; 0,12;	Tufărișuri	Deal	Uniform
Altitudine: 545-565m		Expoziție: N, NV		Înclinație: 5-10°		Sol: Aluvisol eutric
Datele staționale suplimentare: împădurire prin maturizarea diseminărilor; zone cu eroziuni de suprafață și exces de umiditate						
Tipul de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase:						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
100 % Vegetația lemnoasă: diseminări din pădure <i>Carpinus betulus</i> , <i>Pinus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp...</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă cu acord Ocol silvic pentru vegetație silvică, pentru redare pășunatului; păstrare protecție împotriva eroziunii, cu oprirea înaintării în parcelele vecine; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată, desecare zone cu exces de umiditate, nivelare, fertilizare și însămânțare (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 10 kg + <i>Festuca pratensis</i> 8 kg + <i>Phleum pratense</i> 6 kg+ <i>Lolium perenne</i> 2 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 3 kg).						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Cisnădioara Trup I – trup III (VI. Luminoasă - 39)	Pș 2740/1; Pș 2740/3;	2,86; 0,47	Pășune ovine, caprine	Deal	Neuniform
Altitudine: 550-610m Expoziție: V Înclinație: 5-25° Sol: Districambosol tipic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere pădure; zone cu exces de umiditate; fermă de capre; zone cu săpături de mistreți; zone cu ferigă; foarte păscută						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca, pratensis)</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 20%, <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca, pratensis)</i> 15%, <i>Agropyron repens</i> 5%, <i>Bromus sp.</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> ...)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
23 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 7%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Centarurea sp.</i> 3%, <i>Juncus sp.</i> 3%, <i>Taraxacum sp.</i> 2%, 5% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Betonica sp.</i> ...)						
2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Pteridium sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,5-0,7 bovine/ha sau 3-4 ovine, caprine/ha (producție masă verde 5-7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrării propuse 1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine, caprine/ha (producție masă verde 15-20 t/ha)						
20 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure și diseminări cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus avelana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> medii și mari...						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică și redare pășunatului, cu pastrare de arbori izolați sau grupurile de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-5 t/ha CaCO ₃ , 160 kg/ha N, 50 kg/ha P ₂ O ₅ , 55 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârliț sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație; - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Cisnădioara Trup I – trup III (După Ștrand - 39)	Pș 2759 a	~10,00	Pășune ovine	Deal	Neuniform
Altitudine: 535-605m		Expoziție: NV	Inclinație: 5-25°	Sol: Preluvsol tipic		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): eroziuni de suprafață; construcție drum de exploatație de pământ, greu practicabil pe timp umed; diseminări mici și medii						
Tip de pajiște: <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca, pratensis)</i> cu <i>Agrostis tenuis</i>						
50 % Graminee: <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca, pratensis)</i> 20%, <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Anthoxanthum odoratum</i> 10%, 5% alte graminee (<i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> ...)						
5 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 3%, <i>Medicago sp.</i> 1%, <i>Lotus sp.</i> 1%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 3%, 4% alte plante (<i>Prunella sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centarurea sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Pteridium sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine, caprine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine, caprine/ha (producție masă verde 15-20 t/ha)						
25 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure și diseminări cu <i>Betula sp.</i> , <i>Pinus sp.</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> mici și medii...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică și redare pășunatului, cu păstrare de arbori izolați sau grupurile de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 120-150 kg/ha N, 40-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-80 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea pășcutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație;						
- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Ihoala (40)	Pș 2776/3; Tf 2777; Pș 2780; Tf 2783; Pș 2784 a; Tf 2785; Tf 2786; Pș 2779 a; Tf 2787; Tf 2788; Tf 2789; Tf 2791/2; Pș 2792/1 a; Tf 2796; Tf 2797	0,43; 0,03; 2,15; 0,62; ~0,55; 0,27; 0,18; 0,13; 1,07; 0,07; 0,07; ~1,50; 0,23; 0,27	Pășune împădurită, tufărișuri	Deal	Denivelat
Altitudine: 545-645m Expoziție: S, SE, SV Înclinație: 5-15° Sol: Districambosol tipic ~5,00 ha, Preluvosol stagnogleizat ~4,14 ha						
Datele staționale suplimentare: împădurire cu consistență mai mare de 04, prin maturizarea diseminărilor, extinderii pădurii și a vegetației lemnoase de pe pârâuri						
Tipul de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase:						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
100 % Vegetația lemnoasă: <i>Carpinus betulus</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Quercus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp...</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă cu acord Ocol silvic pentru vegetație silvică, pentru redare pășunatului; păstrare protecție împotriva eroziunii unde este cazul, cu oprirea înaintării în parcelele vecine; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată, nivelare, fertilizare și însămânțare (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 10 kg + <i>Festuca pratensis</i> 8 kg + <i>Phleum pratense</i> 6 kg+ <i>Lolium perenne</i> 2 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 3 kg).						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Ihoala (40)	Pș 2779 b; Pș 2784 b; Pș 2792/1 b	~ 1,00; ~0,82; ~0,34	Pășune bovine	Deal	Neuniform
Altitudine: 545-635m Expoziție: S, SE Inclinație: 5-25° Sol: Districambosol tipic ~ 1,00; Preluvosol stagnogleizat ~1,26						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): zone cu exces de umiditate și pipirig; săpături de mistreți; drumuri de exploatație greu practicabile pe timp umed						
Tip de pajiște: <i>Holcus lanatus</i> cu <i>Agrostis tenuis</i>						
60 % Graminee: <i>Holcus lanatus</i> 15%, <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Cynosurus cristatus</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca, pratensis)</i> 5%, <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%, <i>Bromus sp.</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Agropyron repens, Dactylis glomerata, Deschampsia chaespitosa, Lolium perenne...</i>)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 3%, <i>Medicago sp.</i> 1%, <i>Lotus sp.</i> 1%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Juncus sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Prunella sp., Taraxacum sp., Daucus carota, Centaurea sp., Ranunculus sp., Stellaria sp., Carex sp., Rumex sp., Thymus sp., Campanula sp...</i>)						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,5-0,7 bovine/ha sau 3-4 ovine, caprine/ha (producție masă verde 5-7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine, caprine/ha (producție masă verde 15-20 t/ha)						
10 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure și diseminări cu <i>Betula sp., Corylus avellana, Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Alnus sp., Prunus spinosa, Rubus sp.</i> mici și medii...						
Lucrări executate: parțial nivelare mușuroaie și curățire de vegetație lemnoasă						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică și redare pășunatului, cu păstrare pe zone erodate și arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; desecări în zonele cu exces de umiditate; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-5 t/ha CaCO ₃ , 150-160 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-80 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea pășcutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație; - <u>cu angajament de agromediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Măgura Cisnădiei (46)	Pșpd 3083; Pșpd 3084; Pșpd 3092; Pșpd 3093; Pșpd 3100; Pșpd 3103; Pșpd 3105, Pșpd 3112; Pșpd 3117; Pșpd 3138	0,58; 0,26; 2,01; 0,13; 0,18; 0,20; 0,29; 0,61; 3,69; 0,25	Pășune împădurită	Culme deal	Neuniform
Altitudine: 1180-1280m Expoziție: SV, V, E, N Înclinație: 10-35° Sol: Districambosol tipic, Districambosol prespodic						
Datele staționale suplimentare: împădurire cu consistență de aproximativ 04, prin maturizarea diseminărilor și extinderii pădurii						
Tipul de pajiște: -						
10 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca, rubra)</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> ...						
% Leguminoase:						
5 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Thymus sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> ...						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
85 % Vegetația lemnoasă: <i>Betula sp.</i> , <i>Picea sp.</i> ...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă cu acord Ocol silvic pentru vegetație silvică, pentru redare pășunatului; păstrare protecție împotriva eroziunii unde este cazul, cu oprirea înaintării în parcelele vecine; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată, nivelare, fertilizare și însămânțare (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 8 kg + <i>Festuca rubra</i> 7 kg + <i>Poa pratensis</i> 3 kg+ <i>Trifolium repens</i> 3 kg).						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Măgura Cisnădiei (46)	Pșpd 3094; Pșpd 3095; Pșpd 3110; Pșpd 3129	0,91; 0,95; 0,90; 0,09	Pășune împădurită	Culme deal	Denivelată
Altitudine: 1060-1200m Expoziție: S, SE, SV Înclinație: 5-15° Sol: Districambosol prespodic						
Datele staționale suplimentare: împădurire cu consistență mai mare de 04, prin maturizarea diseminărilor și extinderea pădurii						
Tipul de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase:						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
100 % Vegetația lemnoasă: <i>Betula sp., Picea sp...</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: introducerea în Amenajament silvic sau curățire vegetație lemnoasă cu acord Ocol silvic pentru vegetație silvică, pentru redare pășunatului; păstrare protecție împotriva eroziunii unde este cazul, cu oprirea înaintării în parcelele vecine; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată, nivelare, fertilizare și însămânțare (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 8 kg + <i>Festuca rubra</i> 7 kg + <i>Poa pratensis</i> 3 kg+ <i>Trifolium repens</i> 3 kg).						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Măgura Cisnădiei (46)	Pș 3101 a	~ 35,00	Pășune ovine	Culme deal	Neuniform
Altitudine: 1130-1235m		Expoziție: S, SE	Înclinație: 10-40°	Sol: Districambosol tipic; Districambosol prespodic		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): zone piatră la suprafață; săpături de mistreți; mușuroaie vechi înțelenite; tendință de extindere târsă; extindere pădure; parțial păscută; stână refăcută						
Tip de pajiște: <i>Festuca sp. (ovina, rubra)</i> cu <i>Agrostis tenuis</i>						
60 % Graminee: <i>Festuca sp. (ovina, rubra)</i> 25%, <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 10%, <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Bromus sp.</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> , <i>Briza media</i> ...)						
% Leguminoase: <i>Trifolium repens</i> ...						
25 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Thymus sp.</i> 5%, <i>Bryophita sp.</i> 5%, <i>Prunella sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Plantago sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Campanula sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: rar <i>Veratrum album</i> , <i>Hypericum sp.</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 0,8-1 bovine/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha)						
15 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure și diseminări cu <i>Fagus sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Picea sp.</i> medii; diseminări rare de <i>Vaccinium sp.</i> , <i>Caluna vulgaris</i> mici...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (5 t/ha CaCO ₃ , 145-160 kg/ha N, 40-50 kg/ha P ₂ O ₅ , 30-60 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; construire adăpătoare după standarde, întreținere și dezinfectare periodică adăpătoare și zona din jur; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație; - cu <u>angajament de agromediu</u> : lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Măgura Cisnădiei (Curmătura Măgurii - 46)	Pș 3101 b	~ 15,00	Pășune ovine	Culme deal	Neuniformă
Altitudine: 1150-1250m Expoziție: N, NE, S Inclinație: 10-50° Sol: Districambosol prespodic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): zone piatră la suprafață; săpături de mistreți; mușuroaie vechi înțelenite; afiniș și <i>Calluna</i> ; extindere pădure; nepăscută						
Tip de pajiște: <i>Festuca sp. (ovina, valesiaca, rubra)</i> cu <i>Agrostis tenuis</i>						
20 % Graminee: <i>Festuca sp. (ovina, valesiaca, rubra)</i> 25%, <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 10%, <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Bromus sp.</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> , <i>Briza media</i> ...)						
% Leguminoase: <i>Trifolium repens</i> ...						
15 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Thymus sp.</i> 5%, <i>Bryophita sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Prunella sp.</i> , <i>Plantago sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Campanula sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: rar <i>Hypericum sp.</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 95%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,1-0,3 bovine/ha sau 2 ovine/ha (producție masă verde 1-3 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 0,5-07 bovine/ha sau 4 ovine/ha (producție masă verde 5-7 t/ha)						
60 % Vegetația lemnoasă: 50% diseminări de <i>Vaccinium sp.</i> , <i>Caluna vulgaris</i> ; 10% extindere pădure și diseminări cu <i>Fagus sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Picea sp.</i> medii și mari						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă și subarbustivă, mai ales afiniș și <i>Calluna</i> (se poate face și cu mulcerul, amendarea terenului cu 2-5 t/ha var, însămânțare, târlire rațională 2-3 nopți de 1 oaie adultă/mp); oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru curățirea vegetației lemnoase silvice, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 8 kg + <i>Festuca rubra</i> 7 kg + <i>Poa pratensis</i> 3 kg + <i>Trifolium repens</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (5 t/ha CaCO ₃ , 150-160 kg/ha N, 40-50 kg/ha P ₂ O ₅ , 60-70 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârlit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație;						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Măgura Cisnădiei (Plaiul Măgurii - 46)	Pș 3101 c	~ 18,91	Pășune ovine	Culme deal	Neuniformă
Altitudine: 1200-1290m Expoziție: N, NE, S Înclinație: 10-50° Sol: Districambosol prespodic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): zone piatră la suprafață; mușuroaie vechi înțelenite; afiniș și <i>Calluna</i> ; extindere pădure						
Tip de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase: -						
% Diverse plante: rar <i>Achillea millefolium</i> , <i>Thymus sp.</i> , <i>Bryophita sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> ...						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 95%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 0,8-1 bovine/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha)						
95 % Vegetația lemnoasă: 85% <i>Vaccinium sp.</i> , <i>Calluna vulgaris</i> ; 10% extindere pădure și diseminări cu <i>Fagus sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Picea sp.</i> medii și mari						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de vegetație lemnoasă și subarbustivă, mai ales afiniș și <i>Calluna</i> (se poate face și cu mulcerul, amendarea terenului cu 2-5 t/ha var, însămânțare, târlire rațională 2-3 nopți de 1 oaie adultă/mp); oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru curățirea vegetației lemnoase silvice, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare, fertilizare și însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 8 kg + <i>Festuca rubra</i> 7 kg + <i>Poa pratensis</i> 3 kg+ <i>Trifolium repens</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; evitare suprapășunat și supratârlit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație;						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
<i>Cisnădie</i>	<i>Măgura Cisnădiei (46)</i>	Pș 3107; Pș 3109	0,83; 0,89	Pășune ovine	Versant deal	Uniform
Altitudine: 1130-1235m		Expoziție: S	Inclinație: 10-40°	Sol: Districambosol tipic		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): săpături de mistreți; tendință de extindere târsă; extindere pădure						
Tip de pajiște: <i>Festuca sp. (ovina, rubra)</i> cu <i>Agrostis tenuis</i>						
45 % Graminee: <i>Festuca sp. (ovina, rubra)</i> 20%, <i>Agrostis tenuis</i> 10%, <i>Deschampsia chaespitosa</i> 10%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Briza media</i> ...)						
% Leguminoase: <i>Trifolium repens</i> ...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Prunella sp.</i> 5%, <i>Bryophita sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Thymus sp.</i> , <i>Plantago sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Campanula sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: rar <i>Veratrum album</i> , <i>Hypericum sp.</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 0,8-1 bovine/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha)						
25 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure și diseminări cu <i>Fagus sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Picea sp.</i> medii; diseminări rare de <i>Vaccinium sp.</i> , <i>Caluna vulgaris</i> mici...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare, vegetație lemnoasă și subarbustivă, oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (5 t/ha CaCO ₃ , 160 kg/ha N, 50 kg/ha P ₂ O ₅ , 55 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație;						
- cu angajament de agromediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela Descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Măgura Cisnădiei (Pășunea Măgurii - 46)	Pș 3114	36,67	Pășune ovine	Culme deal	Neuniformă
Altitudine: 1028-1248m Expoziție: S, SV Înclinație: 10-50° Sol: Districambosol tipic;						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): zone piatră la suprafață; săpături de mistreți; tendință de extindere târsă; extindere pădure; stână în Pș 3114						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Festuca sp. (ovina, valesiaca, rubra)</i>						
55 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 20%, <i>Festuca sp. (ovina, valesiaca, rubra)</i> 15%, <i>Deschampsia chaespitosa</i> 10%, <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Holcus lanatus</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Briza media</i> ...)						
% Leguminoase: <i>Trifolium repens</i> ...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Thymus sp.</i> 5%, <i>Bryophita sp.</i> 5%, <i>Prunella sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Plantago sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Campanula sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Pteridium sp.</i> , <i>Hypericum sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 0,8-1 bovine/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha)						
25 % Vegetația lemnoasă: 20% extindere pădure și diseminări cu <i>Fagus sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Picea sp.</i> medii; diseminări de <i>Vaccinium sp.</i> , <i>Caluna vulgaris</i> , <i>Crataegus monogyna</i> mici...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare, vegetație lemnoasă și subarbustivă, oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (5 t/ha CaCO ₃ , 160 kg/ha N, 50 kg/ha P ₂ O ₅ , 55 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; construire adăpătoare după standarde, întreținere și dezinfectare periodică adăpătoare și zona din jur; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație; - cu <u>angajament de agromediu</u> : lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Măgura Cisnădiei (46)	Pș 3120; Pș 3125	4,37; 0,07	Pășune ovine	Culme deal	Neuniformă
Altitudine: 1010-1030-1080m Expoziție: S, SV Înclinație: 10-40° Sol: Districambosol tipic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): zone piatră la suprafață; săpături de mistreți; extindere târsă; extindere pădure						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Festuca sp. (ovina, valesiaca, rubra)</i>						
45 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Festuca sp. (ovina, valesiaca, rubra)</i> 15%, <i>Deschampsia sp.</i> 10%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Briza media</i> ...)						
% Leguminoase: <i>Trifolium repens</i> ...						
15 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Bryophita sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Prunella sp.</i> , <i>Thymus sp.</i> , <i>Plantago sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Campanula sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: rar <i>Veratrum album</i> , <i>Hypericum sp.</i> , <i>Pteridium sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 0,8-1 bovine/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha)						
40 % Vegetația lemnoasă: 30% extindere pădure și diseminări cu <i>Fagus sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Picea sp.</i> medii; diseminări de <i>Vaccinium sp.</i> , <i>Caluna vulgaris</i> , <i>Crataegus monogyna</i> mici...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare, vegetație lemnoasă și subarbustivă, oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (5 t/ha CaCO ₃ , 160 kg/ha N, 50 kg/ha P ₂ O ₅ , 55 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație;						
- cu angajament de agromediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Măgura Cisnădiei (46)	Pș 3122; Pș 3123; Pș 3135	5,32; 3,53; 1,66	Pășune ovine	Culme deal	Neuniformă
Altitudine: 965-1055m		Expoziție: S, SV	Inclinație: 10-50°	Sol: Districambosol tipic		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere pădure; târsă, ferigă; săpături de mistreți						
Tip de pajiște: <i>Deschampsia sp. cu Agrostis tenuis</i>						
40 % Graminee: <i>Deschampsia sp.</i> 15%, <i>Agrostis tenuis</i> 10%, <i>Festuca sp. (ovina, valesiaca, rubra)</i> 10%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum, Holcus lanatus, Briza media...</i>)						
% Leguminoase: <i>Trifolium repens...</i>						
10 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 3%, <i>Thymus sp.</i> 3%, <i>Prunella sp.</i> 2%, 5% alte plante (<i>Plantago sp., Potentilla sp., Bryophita sp., Stellaria sp., Carex sp., Hieracium pilosella, Campanula sp...</i>)						
30 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Pteridium sp...</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 0,8-1 bovine/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha)						
20 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure și diseminări cu <i>Fagus sp., Betula sp., Picea sp.</i> medii; diseminări de <i>Vaccinium sp., Caluna vulgaris</i> mici...						
Lucrări executate: -						
<p>Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare, vegetație lemnoasă și subarbustivă, oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; curățirea târsei (nu are valoare nutritivă) și afinișului se poate face și cu mulcerul, apoi amendarea terenului cu 2-5 t/ha var, însămânțare, târlire rațională 2-3 nopți de 1 oaie adultă/mp; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (5 t/ha CaCO₃, 160 kg/ha N, 50 kg/ha P₂O₅, 55 kg/ha K₂O); evitare suprapășunat și supratârlit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; construire adăpătoare după standarde, întreținere și dezinfectare periodică adăpătoare și zona din jur; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație;</p> <p>- cu angajament de agromediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.</p>						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Măgura Cisnădiei (Culmea Măgurii - 46)	Pș 3127; Pș 3128; Pșpd 3131; Pș 3137	0,89; 0,15; 1,24; 0,61	Pășune ovine	Deal	Neuniformă
Altitudine: 1000-1040m		Expoziție: S, N, E	Inclinație: 10-30°	Sol: Districambosol tipic		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere pădure; drumuri dublate pe timp umed						
Tip de pajiște: Agrostis tenuis cu Festuca sp. (ovina, valesiaca, rubra) și Deschampsia sp.						
40 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Festuca sp. (ovina, valesiaca, rubra)</i> 10%, <i>Deschampsia sp.</i> 10%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Briza media</i> ...)						
% Leguminoase: <i>Trifolium repens</i> ...						
10 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 3%, <i>Prunella sp.</i> 2%, 5% alte plante (<i>Bryophita sp.</i> , <i>Thymus sp.</i> , <i>Plantago sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Campanula sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Pteridium sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,1-0,3 bovine/ha sau 2 ovine/ha (producție masă verde 1-3 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 0,8-1 bovine/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha)						
50 % Vegetația lemnoasă: 45% extindere pădure și diseminări cu <i>Fagus sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Picea sp.</i> medii; diseminări de <i>Vaccinium sp.</i> , <i>Caluna vulgaris</i> , <i>Crataegus monogyna</i> mici...						
Lucrări executate: -						
<p>Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare, vegetație lemnoasă și subarborescentă, curățirea târsei (nu are valoare nutritivă) și afinșului se poate face și cu mulcerul, apoi amendarea terenului cu 2-5 t/ha var, însămânțare, târlire rațională 2-3 nopți de 1 oaie adultă/mp; oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (5 t/ha CaCO₃, 160 kg/ha N, 50 kg/ha P₂O₅, 55 kg/ha K₂O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea pășcutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație;</p> <p>- <u>cu angajament de agromediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.</p>						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Măgura Cisnădioarei (46)	Pș 3140; Pș 3133	5,37; 0,10	Pășune ovine	Deal	Neuniform
Altitudine: 1020-1080m Expoziție: N, NE Înclinație: 10-30° Sol: Districambosol tipic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): săpături de mistreți; extindere pădure; tabără veche						
Tip de pajiște: <i>Festuca sp. (ovina, rubra)</i> cu <i>Agrostis tenuis</i>						
65 % Graminee: <i>Festuca sp. (ovina, rubra)</i> 25%, <i>Agrostis tenuis</i> 20%, <i>Deschampsia sp.</i> 10%, <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Holcus lanatus</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Briza media</i> ...)						
% Leguminoase: <i>Trifolium repens</i> ...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Potentilla sp.</i> 5%, <i>Bryophita sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Prunella sp.</i> , <i>Thymus sp.</i> , <i>Plantago sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Campanula sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: rar <i>Veratrum album</i> , <i>Hypericum sp.</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 0,8-1 bovine/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha)						
15 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure și diseminări cu <i>Fagus sp.</i> , <i>Betula sp.</i> medii...						
Lucrări executate: -						
<p>Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (5 t/ha CaCO₃, 145 kg/ha N, 40 kg/ha P₂O₅, 30 kg/ha K₂O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație;</p> <p>- cu angajament de agromediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.</p>						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Tomnatec (78)	Pș 3882	1,81	Pășune ovine	Munte	Uniform
Altitudine: 1515-1520m		Expoziție: S	Inclinație: 10-15°	Sol: Prepodzol tipic		
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): târsă; extindere pădure						
Tipul de pajiște: <i>Deschampsia sp. cu Festuca sp. (supina, rubra)</i>						
80 % Graminee: <i>Deschampsia sp.</i> 50%, <i>Festuca sp. (supina, rubra)</i> 20%, <i>Agrostis sp.</i> 10%...						
% Leguminoase: -						
5 % Diverse plante: <i>Carex sp.</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> , <i>Veronica sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> ...						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha - târsa poate să ajungă la 7-8 t/ha, dar e nevalorosă nutritiv); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 0,6-0,8 bovine/ha sau 4 ovine/ha (producție masă verde 6-8 t/ha)						
20 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure și diseminări de <i>Picea sp.</i> mici, medii și mari; diseminări <i>Vaccinium sp.</i> , <i>Caluna vulgaris</i> ...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: acordul Ocolului silvic de curățire vegetație lemnoasă și redare pășunatului, cu pastrare de arbori izolați sau grupurile de arbori ca zone de refugiu pentru animale; curățire repetată <i>Deschampsia sp.</i> (nu este valorosă nutritiv) și afiniș cu mulcerul, amendarea terenului cu 2-5 t/ha var, însămânțare, târlire rațională 2-3 noți de 1 oaie adultă/mp.; nivelare mușuroaie; fertilizare naturală cu gunoi de ovine sau chimică anuală (5 t/ha CaCO ₃ , 170 kg/ha N, 35 kg/ha P ₂ O ₅ , 40 kg/ha K ₂ O); supraînsămânțare cu amestec de ierburi (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); pășunat rațional, pe subparcele; târlire rațională; evitare suprapășunat și supratârlit sau cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație; - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Tomnatec (78)	Pșpd 3885; Pșpd 3886; Pșpd 3888; Pșpd 3889; Pșpd 3891; Pșpd 3892	0,03; 0,16; 1,13; 0,35; 0,35; 3,96	Pășune împădurită	Munte	Uniform
Altitudine: 1370-1395m		Expoziție: S	Inclinație: 5-15°	Sol: Aluvisol distric litic 1,19 ha, Districambosol prespodic 4,79 ha		
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): împădurire consistență 0,4-0,6; drum de exploatație; pâraul Tomnatec						
Tipul de pajiște: -						
15 % Graminee: <i>Festuca sp. (supina, rubra)</i> , <i>Agrostis sp.</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Deschampsia sp.</i> ...						
% Leguminoase: -						
5 % Diverse plante: <i>Carex sp.</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> , <i>Veronica sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> ...						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
80 % Vegetația lemnoasă: <i>Picea sp.</i> , rar <i>Fagus sp.</i> ... mari						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: introducerea în Amenajament silvic sau curățire repetată de vegetație lemnoasă; oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru curățirea vegetației lemnoase silvice, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare, însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 8 kg + <i>Festuca rubra</i> 7 kg + <i>Poa pratensis</i> 3 kg + <i>Trifolium repens</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare naturală cu gunoi de ovine sau chimică anuală (5 t/ha CaCO ₃ , 150-180 kg/ha N, 40-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60-85 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârlit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Tomnatec (78)	Pșpd 3894; Pșpd 3896; Pșpd 3904; Pșpd 3906; Pșpd 3907; Pșpd 3911a	4,51; 0,31; 5,33; 0,54; 1,18; ~ 25,00	Pășune împădurită	Munte	Uniformă
Altitudine: 1375-1385m		Expoziție: S	Înclinație: 10-45°	Sol: Prepodzol tipic		
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): împădurire consistentă de 04						
Tipul de pajiște: -						
20 % Graminee: <i>Festuca sp. (supina, rubra)</i> , <i>Agrostis sp.</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Deschampsia sp...</i>						
% Leguminoase: -						
10 % Diverse plante: <i>Carex sp.</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> , <i>Veronica sp.</i> , <i>Potentilla sp...</i>						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
70 % Vegetația lemnoasă: 65% <i>Picea sp.</i> , rar <i>Fagus sp.</i> mari, diseminări <i>Vaccinium sp.</i> , <i>Calluna vulgaris</i>						
Lucrări executate: -						
<p>Lucrări propuse: introducerea în Amenajament silvic sau curățire repetată de vegetație lemnoasă; oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru curățirea vegetației lemnoase silvice, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare, însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 8 kg + <i>Festuca rubra</i> 7 kg + <i>Poa pratensis</i> 3 kg + <i>Trifolium repens</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare naturală cu gunoi de ovine sau chimică anuală (5 t/ha CaCO₃, 170-200 kg/ha N, 35-40 kg/ha P₂O₅, 40-55 kg/ha K₂O); evitarea suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatare</p> <p>- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de ovine 3,6 t/ha.</p>						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Tomnatec (78)	Pș 3911 b	~ 36,34	Pășune ovine	Munte	Uniform
Altitudine: 1515-1520m		Expoziție: S	Înclinație: 10-40°	Sol: Prepodzol tipic ~17,64; Districambosol prespodic 18,70 ha		
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): târsă; extindere pădure și diseminări; stână						
Tipul de pajiște: <i>Deschampsia sp. cu Festuca sp. (supina, rubra)</i>						
75 % Graminee: <i>Deschampsia sp.</i> 50%, <i>Festuca sp. (supina, rubra)</i> 15%, <i>Agrostis sp.</i> 10%...						
% Leguminoase: -						
10 % Diverse plante: <i>Carex sp.</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> , <i>Veronica sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Prunella sp...</i>						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha - târsa poate să ajungă la 7-8 t/ha, dar e nevalorosă nutritiv); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 0,6-0,8 bovine/ha sau 4 ovine/ha (producție masă verde 6-8 t/ha)						
15 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure și diseminări de <i>Picea sp.</i> mici, medii și mari; diseminări <i>Vaccinium sp.</i> , <i>Calluna vulgaris...</i>						
Lucrări executate: curățire parțială de vegetație lemnoasă						
<p>Lucrări propuse: acordul Ocolului silvic de curățire vegetație lemnoasă și redare pășunatului, cu păstrare de arbori izolați sau grupurile de arbori ca zone de refugiu pentru animale; curățire repetată <i>Deschampsia sp.</i> (nu este valorosă nutritiv) și afiniș cu mulcerul, amendarea terenului cu 2-5 t/ha var, însămânțare, târlire rațională 2-3 nopți de 1 oaie adultă/mp.; nivelare mușuroaie fertilizare naturală cu gunoi de ovine sau chimică anuală (5 t/ha CaCO₃, 150-200 kg/ha N, 35-40 kg/ha P₂O₅, 40-60 kg/ha K₂O); supraînsămânțare cu amestec de ierburi (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); pășunat rațional, pe subparcele; târlire rațională; evitarea suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; construire adăpătoare după standarde, întreținere și dezinfectare periodică adăpătoare și zona din jur; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatare;</p> <p>- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de ovine 3,6 t/ha.</p>						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Tomnatec (78)	Pșpd 3905; Pșpd 3916; Pșpd 3919 a	10,44; 1,37; ~5,00	Pășune împădurită	Munte	Uniformă
Altitudine: 1420-1510m		Expoziție: S	Înclinație: 10-45°		Sol: Prepodzol tipic	
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): consistență sub 04						
Tipul de pajiște: -						
20 % Graminee: <i>Festuca sp. (supina, rubra)</i> , <i>Agrostis sp.</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Deschampsia sp...</i>						
% Leguminoase: -						
5 % Diverse plante: <i>Carex sp.</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> , <i>Veronica sp.</i> , <i>Potentilla sp...</i>						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
75% Vegetația lemnoasă: 70% diseminări mici, medii <i>Picea sp.</i> , rar <i>Fagus sp.</i> ; diseminări <i>Vaccinium sp.</i> , <i>Calluna vulgaris</i>						
Lucrări executate: -						
<p>Lucrări propuse: curățire repetată de vegetație lemnoasă și subarbustivă, cu acord Ocol silvic pentru curățirea vegetației lemnoase silvice, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare, însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 8 kg + <i>Festuca rubra</i> 7 kg + <i>Poa pratensis</i> 3 kg + <i>Trifolium repens</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare naturală cu gunoi de ovine sau chimică anuală (5 t/ha CaCO₃, 170-200 kg/ha N, 35-40 kg/ha P₂O₅, 40-55 kg/ha K₂O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație</p> <p>- <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de ovine 3,6 t/ha.</p>						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela Descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Tomnatec (78)	Pșpd 3915; Pșpd 3917; Pșpd 3918	1,66; 1,37; 11,42	Pășune împădurită	Munte	Uniformă
Altitudine: 1375-1385m		Expoziție: S	Înclinație: 5-15°		Sol: Prepodzol tipic	
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): împădurire consistență de 04						
Tipul de pajiște: -						
20 % Graminee: <i>Festuca sp. (supina, rubra)</i> , <i>Agrostis sp.</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Deschampsia sp...</i>						
% Leguminoase: -						
10 % Diverse plante: <i>Carex sp.</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> , <i>Veronica sp.</i> , <i>Potentilla sp...</i>						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
70 % Vegetația lemnoasă: 65% <i>Picea sp.</i> , rar <i>Fagus sp.</i> mari, diseminări <i>Vaccinium sp.</i> , <i>Calluna vulgaris</i>						
Lucrări executate: -						
<p>Lucrări propuse: introducere în Amenajament silvic sau curățire repetată de vegetație lemnoasă; oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru curățirea vegetației lemnoase silvice, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare, însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 8 kg + <i>Festuca rubra</i> 7 kg + <i>Poa pratensis</i> 3 kg + <i>Trifolium repens</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare naturală cu gunoi de ovine sau chimică anuală (5 t/ha CaCO₃, 170-200 kg/ha N, 35-40 kg/ha P₂O₅, 40-55 kg/ha K₂O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație</p> <p>- <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de ovine 3,6 t/ha.</p>						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela Descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Tomnatec (78)	Pș 3919 b	~ 9,34	Pășune ovine	Munte	Uniform
Altitudine: 1515-1520m		Expoziție: S		Înclinație: 10-35°		Sol: Prepodzol tipic
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): târsă; extindere pădure și diseminări						
Tipul de pajiște: <i>Deschampsia sp. cu Festuca sp. (supina, rubra)</i>						
60 % Graminee: <i>Deschampsia sp.</i> 40%, <i>Festuca sp. (supina, rubra)</i> 10%, <i>Agrostis sp.</i> 10%...						
% Leguminoase: -						
10 % Diverse plante: <i>Carex sp., Alchemilla vulgaris, Veronica sp., Potentilla sp., Prunella sp.</i> ...						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha - târsa poate să ajungă la 7-8 t/ha, dar e nevalorosă nutritiv); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 0,6-0,8 bovine/ha sau 4 ovine/ha (producție masă verde 6-8 t/ha)						
30 % Vegetația lemnoasă: 20% diseminări <i>Vaccinium sp., Caluna vulgaris</i> extindere pădure și diseminări de <i>Picea sp.</i> mici, medii și mari;...						
Lucrări executate: curățire parțială de vegetație lemnoasă						
Lucrări propuse: acordul Ocolului silvic de curățire vegetație lemnoasă și redare pășunatului, cu pastrare de arbori izolați sau grupurile de arbori ca zone de refugiu pentru animale; curățire repetată <i>Deschampsia sp.</i> (nu este valorosă nutritiv) și afiniș cu mulcerul, amendarea terenului cu 2-5 t/ha var, însămânțare, târlire rațională 2-3 nopți de 1 oaie adultă/mp.; nivelare mușuroaie; fertilizare naturală cu gunoi de ovine sau chimică anuală (5 t/ha CaCO ₃ , 170-200 kg/ha N, 35-40 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-55 kg/ha K ₂ O); supraînsămânțare cu amestec de ierburi (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); pășunat rațional, pe subparcele; târlire rațională; evitare suprapășunat și supratârlit sau cosit cel puțin o dată pe an; construire adăpătoare după standarde, întreținere și dezinfectare periodică adăpătoare și zona din jur; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatare;						
- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Tomnatec (78)	Pș 4254 b	~80,00	Pășune ovine	Munte	Uniform
Altitudine: 1700-1735m		Expoziție: E		Inclinație: 5-35°		Sol: Prepodzol tipic
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): stână; tendință extindere pădure						
Tipul de pajiște: <i>Deschampsia sp. cu Festuca sp. (supina, rubra)</i>						
84 % Graminee: <i>Deschampsia sp.</i> 50%, <i>Festuca sp. (supina, rubra)</i> 20%, <i>Agrostis sp.</i> 10%, <i>Nardus stricta</i> 4%...						
1 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i>						
10 % Diverse plante: <i>Carex sp.</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> , <i>Thymus sp.</i> , <i>Veronica sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Sonchus sp.</i> , <i>Campanula sp.</i> , <i>Bryophita sp.</i> ...						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha - tărșă poate să ajungă la 7-8 t/ha, dar e nevalorosă nutritiv); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 0,8-1 bovine/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha)						
5 % Vegetația lemnoasă: diseminări <i>Picea sp.</i> , <i>Vaccinium sp.</i> , <i>Caluna vulgaris</i> ...						
Lucrări executate: curățire vegetație lemnoasă						
Lucrări propuse: curățire repetată <i>Deschampsia sp.</i> (nu este valorosă nutritiv) și afiniș, amendarea terenului cu 2-5 t/ha var, însămânțare, târlire rațională 2-3 nopti de 1 oaie adultă/mp.; nivelare mușuroaie; fertilizare naturală cu gunoi de ovine sau chimică anuală (5 t/ha CaCO ₃ , 170-200 kg/ha N, 35-40 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-55 kg/ha K ₂ O); supraînsămânțare cu amestec de ierburi (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); pășunat rațional, pe subparcele; târlire rațională; evitare suprapășunat și supratârlit sau cosit cel puțin o dată pe an; construire adăpătoare după standarde, întreținere și dezinfectare periodică adăpătoare și zona din jur; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație; - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis discutul; însămânțare cu specii din flora locală; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Voineag (94)	Pș 4233	4,84	Pș alpină	Coamă Munte	Neuniform
Altitudine: 1850-2000m		Expoziție: S		Înclinație: 5-40°		Sol: Podzol tipic
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): zone cu piatră, afiniș						
Tipul de pajiște: <i>Nardus stricta</i> cu <i>Festuca sp. (supina, rubra)</i>						
55 % Graminee: <i>Nardus stricta</i> 25%, <i>Festuca sp. (supina, rubra)</i> 15%, <i>Agrostis sp.</i> 10%, <i>Deschampsia sp.</i> 5%...						
% Leguminoase: -						
20% Diverse plante: <i>Bryophita</i> 10%, <i>Carex sp.</i> (3%), <i>Alchemilla vulgaris</i> (3%), <i>Sonchus sp.</i> (2%), <i>Potentilla sp.</i> (2%)...						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 80%						
Încărcarea cu animale: în condițiile actuale producția de masă verde este de 1-3 t/ha (încărcătura cu animale/ha 0,2-0,3 bovine sau 2 ovine)						
40 % Vegetația lemnoasă: <i>Vaccinium sp.</i> ...						
Lucrări executate: curățire parțială vegetație lemnoasă						
Lucrări propuse: curățire repetată de vegetație subarborescentă - afiniș, amendarea terenului cu 2-5 t/ha var, însămânțare, tălire rațională 2-3 nopți de 1 oaie adultă/mp.; fertilizare naturală cu gunoi de ovine; supraînsămânțare cu amestec de ierburi (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); pășunat rațional, pe subparcele; tălire rațională; evitare suprapășunat și supratărlit; amenajare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Voineag (94)	Pșpd 4237; Pșpd 4238; Pșpd 4239; Pșpd 4241; Pșpd 4242; Pșpd 4244; Pșpd 4245; Pșpd 4249; Pșpd 4251; Pșpd 4258	1,06; 0,14; 0,14; 0,19; 0,16; 0,28; 0,28; 3,20; 2,38; 2,60	Pășune împădurită	Munte	Neuniform
Altitudine: 1580-1775m		Expoziție: S,E		Înclinație: 10-40°		Sol: Podzol tipic 7,83 ha; Podzol litic 2,60 ha
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): împădurire consistență de 02-06 prin maturizare diseminări de molid						
Tipul de pajiște: -						
10-40 % Graminee: <i>Festuca sp. (supina, rubra)</i> , <i>Agrostis sp.</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Deschampsia sp.</i>						
% Leguminoase: -						
10 % Diverse plante: <i>Carex sp.</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> , <i>Veronica sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> ...						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
50-80 % Vegetația lemnoasă: <i>Picea sp.</i> diseminat						
Lucrări executate: curățire parțială vegetație lemnoasă						
Lucrări propuse: curățire repetată de vegetație lemnoasă; oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru curățirea vegetației lemnoase silvice, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare, fertilizare naturală cu gunoi de ovine sau chimică anuală (5 t/ha CaCO ₃ , 160-200 kg/ha N, 40 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-55 kg/ha K ₂ O); însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 8 kg + <i>Festuca rubra</i> 7 kg + <i>Poa pratensis</i> 3 kg + <i>Trifolium repens</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; evitare suprapășunat și supratărlit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Voineag (94)	Pșpd 4256; Pșpd 4257	0,32; 1,42	Pășune ovine	Munte	Neuniform
Altitudine: 1745-1775m		Expoziție: E		Înclinație: 10-40°		Sol: Podzol litic
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): afiniș crescut pe curățire a vegetației lemnoase; piatră la suprafață						
Tipul de pajiște: -						
10 % Graminee: <i>Festuca sp. (supina, rubra)</i> , <i>Agrostis sp.</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Deschampsia sp.</i>						
% Leguminoase: -						
10 % Diverse plante: <i>Carex sp.</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> , <i>Veronica sp.</i> , <i>Potentilla sp...</i>						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95%						
Încărcarea cu animale: -						
75 % Vegetația lemnoasă: <i>Vaccinium sp.</i> diseminat						
Lucrări executate: curățire parțială vegetație lemnoasă						
Lucrări propuse: curățire repetată de afiniș, amendarea terenului cu 2-5 t/ha var, însămânțare, târlire rațională 2-3 nopți de 1 oaie adultă/mp; fertilizare naturală cu gunoi de ovine și însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 8 kg + <i>Festuca rubra</i> 7 kg + <i>Poa pratensis</i> 3 kg + <i>Trifolium repens</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; evitare suprapășunat și supratârlit sau cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela Descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Voineag (94)	Pș 4259; Pș 4254 a	17,68; ~16,00	Pășune ovine	Munte	Neuniform
Altitudine: 1700-1735m		Expoziție: E		Înclinație: 10-25°		Sol: Podzol tipic
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): târsă; drum de exploatare dublat pe timp umed						
Tipul de pajiște: <i>Deschampsia sp. cu Festuca sp. (supina, rubra)</i>						
60 % Graminee: <i>Deschampsia sp.</i> 30%, <i>Nardus stricta</i> 10%, <i>Festuca sp. (supina, rubra)</i> 10%, <i>Agrostis sp.</i> 10%...						
% Leguminoase: -						
10 % Diverse plante: <i>Carex sp.</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> , <i>Thymus sp.</i> , <i>Veronica sp.</i> , <i>Potentilla sp...</i>						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha - târsa poate să ajungă la 7-8 t/ha, dar e nevalorosă nutritiv); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 0,5-0,7 bovine/ha sau 3-4 ovine/ha (producție masă verde 5-7 t/ha)						
10 % Vegetația lemnoasă: diseminări <i>Vaccinium sp.</i> , <i>Caluna vulgaris...</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată <i>Deschampsia sp.</i> (nu este valorosă nutritiv) și afiniș, amendarea terenului cu 2-5 t/ha var, însămânțare, târlire rațională 2-3 nopți de 1 oaie adultă/mp.; nivelare mușuroaie; fertilizare naturală cu gunoi de ovine sau chimică anuală (5 t/ha CaCO ₃ , 200 kg/ha N, 30 kg/ha P ₂ O ₅ , 50 kg/ha K ₂ O); supraînsămânțare cu amestec de ierburi (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); pășunat rațional, pe subparcele; târlire rațională; evitare suprapășunat și supratârlit sau cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație; - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Voineag (94)	Pș 4254 c	~74,87	Pș ovine	Coamă Munte	Neuniform
Altitudine: 1770-2050m		Expoziție: N	Înclinație: 10-70°	Sol: Podzol tipic; Podzol litic		
Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): zone cu piatră, afiniș, bujor, jnepeniș						
Tipul de pajiște: -						
10 % Graminee: <i>Nardus stricta</i> , <i>Festuca sp. (supina, rubra)</i> , <i>Agrostis sp.</i> , <i>Deschampsia sp...</i>						
% Leguminoase: -						
10% Diverse plante: <i>Bryophita sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> , <i>Sonchus sp.</i> , <i>Potentilla sp...</i>						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95%						
Încărcarea cu animale: -						
75 % Vegetația lemnoasă: <i>Vaccinium sp.</i> , <i>Rhododendron sp.</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Picea sp...</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: declarare arie protejată						

b. Pajiști ADS:

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Sibiului (16)	Pș 1183/1/1 - Fn 1227/2	7,89	Pș, Fn	Deal	Denivelat
Altitudine: 495-505m Expoziție: V Înclinație: 5-15° Sol: Luvosol stagnogleizat						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): nepăscută, extindere tufăriș și vegetația de pe pârâuri sau din tufărișuri, diseminări de arbuști mici și medii; zone cu eroziuni de suprafață; în parcela Pș 1199/1 se intră cu organizare de șantier						
Tip de pajiște: <i>Festuca sp. (valesiaca, rupicola)</i> cu <i>Agrostis tenuis</i>						
40 % Graminee: <i>Festuca sp. (valesiaca, rupicola)</i> 15%, <i>Agrostis tenuis</i> 10%, <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Holcus lanatus</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Agropyron repens</i> ...)						
5 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> , <i>Medicago sp.</i> , <i>Lotus sp.</i> ...						
25 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 10%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Centaurea sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha (producție masă verde 20-22 t/ha)						
30 % Vegetația lemnoasă: extindere tufărișuri cu <i>Corylus avellana</i> , <i>Salix sp.</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Cornus sp.</i> medii și diseminări de <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici și medii...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 150-170 kg/ha N, 45-50 kg/ha P ₂ O ₅ , 30-50 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Lunca Seviș (20)	Pș 1351/1; Pș 1365/5; Pș 1367 - Pș 1375	1,21; 2,45; 7,47	Pș semi împădurită	Luncă	Neuniform
Altitudine: 445-460m Expoziție: NE Inclinație: 5-10° Sol: Aluvisol eutric gleizat, Preluvisol tipic						
Datele staționale suplimentare: tufărișuri de pe pârâu și de pe taluzuri, cu tendință de extindere spre parcelele vecine; zone cu diseminări arbustive mici și îmburuienate						
Tipul de pajiște: -						
5-10 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Festuca sp. (valesiaca, rupicola)</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> , <i>Agropyron repens</i> ...						
% Leguminoase: -						
5-10 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> , <i>Plantago sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> ...						
1-5 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Tussilago farfara</i> , <i>Dipsacus arvense</i> , <i>Xanthium sp.</i> ,						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
80-100 % Vegetația lemnoasă: pe pârâu <i>Alnus sp.</i> , <i>Salix sp.</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> ; diseminări de <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă cu acord Ocol silvic pentru vegetație silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe pante și zone erodate, cu oprirea înaintării în parcelele vecine și curățarea diseminărilor, pentru redare pășunatului; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată, nivelare, fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 140-150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 80 kg/ha K ₂ O) și însămânțare (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 10 kg + <i>Festuca pratensis</i> 8 kg + <i>Phleum pratense</i> 6 kg+ <i>Lolium perenne</i> 2 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 3 kg).						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Lunca Seviș (20)	Pș 1365/1; Pș 1365/8	4,50; 1,89	Pș arată	Luncă	Denivelată
Altitudine: 440-450m		Expoziție: NE	Înclinație: 0-10°	Sol: Aluvisol eutric gleizat		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): 50% arat și semănat cutură ascunsă; zone cu extindere neproductiv; diseminări de arbuști mici și medii; zone cu pipirig; zone cu eroziuni de suprafață						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca)</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca)</i> 10%, <i>Holcus lanatus</i> 10%, <i>Agropyron repens</i> 5%, <i>Bromus sp.</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Briza media</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> ...)						
5 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 3%, <i>Medicago sp.</i> 2%, <i>Lotus sp.</i> ...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Centaurea sp.</i> 5%, <i>Carex sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Plantago sp.</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Filipendula sp.</i> , <i>Symphytum officinale</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Cirsium arvense</i> , <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Mentha sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,8-0,1 bovine/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 8-10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha (producție masă verde 20-25 t/ha)						
10 % Vegetația lemnoasă: diseminări cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici, extindere neproductiv cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> medii						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie, curățire parțială						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (140 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 85 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Viilor (22)	Pș 1489 - Pș 1493/3	0,36	Pș ovine	Luncă	Neuniformă
Altitudine: 450m		Expoziție: N	Înclinație: 0-3°	Sol: Gleiosol tipic		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere vegetație lemnoasă de pe pârâu; diseminări de arbuști						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca)</i> 5%, <i>Agropyron repens</i> 5%, <i>Bromus sp.</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Briza media</i> , <i>Deschampsia sp...</i>)						
15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%..						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Taraxacum sp.</i> 5%, <i>Carex sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Plantago sp.</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Symphytum officinale</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp...</i>)						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,5-0,7 bovine/ha sau 3-4 ovine/ha (producție masă verde 5-7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1-1,2 bovine/ha sau 5-6 ovine/ha (producție masă verde 18-20 t/ha)						
10-30 % Vegetația lemnoasă: extindere vegetație lemnoasă de pe pârâu cu <i>Salix sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> medii și mari; diseminări cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i>						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă pentru împiedicarea înaintării în parcelă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (145 kg/ha N, 45 kg/ha P ₂ O ₅ , 55 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratărlit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație						
- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Viilor (22)	Pș 1505/1/1 - Pș 1524/1/2; Fn 1716/2	75,85; 0,11	Pș ovine – Fn parțială	Deal	Neuniform
Altitudine: 447-520m Expoziție: V Înclinație: 3-30° Sol: Preluvosol tipic; Preluvosol stagnogleizat						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere vegetație lemnoasă de pe pârâuri și lizieră pădure; diseminări de arbuști; zone fertilizate și utilizată ca fâneață, cu focare de cuscută; zone cu exces de umiditate și zone cu eroziuni de suprafață; zone păscute de oi până târziu; drum de exploatare dublat pe timp umed; în 1524 adăpătoare veche din beton, neîntreținută, cu exces de umiditate în jur						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Festuca sp. (rupicola, pratensis)</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 20%, <i>Festuca sp. (rupicola, pratensis)</i> 10%, <i>Cynosurus cristatus</i> 10%, <i>Bromus sp.</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Holcus lanatus</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Briza media</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Deschampsia sp...</i>)						
25 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 10%, <i>Lotus sp.</i> 3%, <i>Vicia sp.</i> 2% în zona cosită...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Carex sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Mentha sp.</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Rumex sp...</i>)						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> rar, <i>Cuscuta sp...</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,5-0,7 ÷ 0,8-1 bovine/ha sau 3-4 ÷ 5-6 ovine/ha (producție masă verde 5-7 t/ha, chiar 10-15 t în fâneață); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha (producție masă verde 20-25 t/ha)						
5 % Vegetația lemnoasă: extindere vegetație lemnoasă de pe pârâu cu <i>Salix sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> ; din lizieră pădure cu <i>Carpinus betulus</i> medii și mari; diseminări rare cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie, fertilizare parțială						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă pentru împiedicarea înaintării în parcelă, păstrare doar pe eroziuni pentru protecție, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; drenare zone cu exces de umiditate; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 145-160 kg/ha N, 45-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 45-70 kg/ha K ₂ O); folosire rațională a pajiștii; evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; construire adăpătoare după standarde, întreținere și dezinfectare periodică adăpătoare și zona din jur; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație						
- <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Viilor (25)	Fn 1594/2 - Fn 1652	0,62	Fn semiîmpădurită	Luncă	Neuniformă
Altitudine: 415-420m Expoziție: S Înclinație: 0-3° Sol: Gleiosol tipic, Gleiosol aluvic						
Datele staționale suplimentare: tufărișuri de pe pârâu, cu tendință de extindere; zone cu diseminări arbustive mici și îmbruienate						
Tipul de pajiște: -						
10-30 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Festuca sp. (valesiaca, rupicola)</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Agropyron repens</i> ...						
5 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> ...						
10 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> , <i>Plantago sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> ...						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Tussilago farfara</i> ...						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
55-75 % Vegetația lemnoasă: pe pârâu <i>Alnus sp.</i> , <i>Salix sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> ; diseminări de <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă cu acord Ocol silvic pentru vegetație silvică; curățarea diseminărilor, pentru redare pășunatului; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată, nivelare, fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (145-150 kg/ha N, 45-50 kg/ha P ₂ O ₅ , 55-75 kg/ha K ₂ O) și însămânțare (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 10 kg + <i>Festuca pratensis</i> 8 kg + <i>Phleum pratense</i> 6 kg+ <i>Lolium perenne</i> 2 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 3 kg).						

c. Pajiști particulari

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Lunca Seviș (3 – Anexa I)	Fn 340 - Fn 353	2,60	Fn	Luncă	Uniformă
Altitudine: 455-460m		Expoziție: S	Înclinație: 0-5°		Sol: Aluvisol eutric	
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): fânețe cosite, unele fertilizate; pe unele pasc ovine până primăvara târziu						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
60 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 15%, <i>Cynosurus cristatus</i> 10%, <i>Festuca sp.</i> (<i>pratensis</i> , <i>rupicola</i> ...) 10%, <i>Bromus sp.</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Phleum pratense</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Briza media</i> ...)						
15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%, <i>Vicia sp.</i> ...						
25 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 10%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Centaurea sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Rhinanthus minor</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Erigeron sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Filipendula sp.</i> , <i>Symphytum officinale</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: rar <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 8-10 t/ha până la 15 t/ha pe zone parțial fertilizate (0,8-1 bovine/ha sau 4-5 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 25-30 t/ha (1,2-1,3 bovine/ha sau 6-6,2 ovine/ha)						
% Vegetația lemnoasă: diseminări rare cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie, curățire și fertilizare parțială						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (150 kg/ha N, 30-45 kg/ha P ₂ O ₅ , 65-80 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Lunca Seviș (20)	Fn 1380 - Fn 1385; Fn 1391; Fn 1393	1,62; 0,13; 0,65	Fn	Luncă	Neuniformă
Altitudine: 450-455m Expoziție: E Înclinație: 0-5° Sol: Gleiosol aluvic; Preluosol stagnogleizat						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): zone neîntreținute în lungul pâraului, cu extindere vegetație arbustivă; diseminări de arbuști mici și medii; zone cu exces de umiditate, pipirig și stuf; zone cu eroziuni de suprafață						
Tip de pajiște: -						
15 % Graminee: <i>Holcus lanatus</i> , <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Festuca sp. (rupicola, rubra)</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> , <i>Agropyron repens</i> ...						
% Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> ...						
25 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Juncus sp.</i> 5%, <i>Taraxacum sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Prunella sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp.</i>)						
10 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Phragmites sp.</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Carduus sp.</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 3-5 t/ha (0,3-0,5 bovine/ha sau 2 ovine/ha; în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, producție masă verde 15-20 t/ha (1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha)						
50 % Vegetația lemnoasă: extindere vegetație arbustivă de pe pârau cu <i>Salix sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> medii și mari; diseminări cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; păstrare protecție împotriva eroziunii pe eroziuni; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; drenare zone cu exces de umiditate; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (150 kg/ha N, 30-50 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-75 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea pășcutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Lunca Seviș (20; 3 - Anexa 1); Între Păduri	Fn 1387; Fn 1390; Fn 1399; Fn 1401; Fn 367	0,40; 1,67; 1,76; 2,62; 0,12	Fn arată	Luncă	Uniformă
Altitudine: 450-457m Expoziție: E Înclinație: 0-3° Sol: Preluvosol stagnogleizat; Gleiosol aluvic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): cultură de porumb						
Tip de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase: -						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
% Vegetația lemnoasă: -						
Lucrări executate: arătură						
Lucrări propuse: revenire la stadiul de fâneață; însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 12 kg + <i>Festuca pratensis</i> 5 kg + <i>Phleum pratense</i> 5 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 3 kg + <i>Medicago sativa</i> 5 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (150 kg/ha N, 30-50 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-75 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Între Păduri Cisnădioara (4, 5)	Fn 373; Fn 382	0,24; 0,26	Fn	Luncă	Uniformă
Altitudine: 440m Expoziție: SE Înclinație: 0-3° Sol: Aluvisol eutric-entic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): fânețe neutilizate cu risc de împădurire						
Tip de pajiște: -						
15 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Festuca sp.</i> (<i>rupicola</i> , <i>valesiaca</i>), <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Agropyron repens</i> ...						
% Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> ...						
15 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp.</i> ...)						
10 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Carduus sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
60 % Vegetația lemnoasă: 40% diseminări cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici; 20% extindere vegetație arbustivă de pe pârâu cu <i>Salix sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> medii și mari;						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 12 kg + <i>Festuca pratensis</i> 5 kg + <i>Phleum pratense</i> 5 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 3 kg + <i>Medicago sativa</i> 5 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (150 kg/ha N, 50 kg/ha P ₂ O ₅ , 55 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Între Păduri Cisnădioara (5); Dealul Cucului	Pș 407; Pș 414; Pș 416/1; Pș 416/2	1,42; 1,69; 1,43; 0,05	Pș	Deal	Neuniform
Altitudine: 520-530m		Expoziție: E	Înclinație: 5-15°	Sol: Aluvisol eutric-entic		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): pășuni neutilizate cu risc de împădurire; ferigă						
Tip de pajiște: -						
25-35 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca)</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Agropyron repens</i> ...						
% Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> ...						
15 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp.</i>)						
10 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Pteridium sp.</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Carduus sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
40-50 % Vegetația lemnoasă: 20% diseminări cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici; 20-30% extindere vegetație lemnoasă din liziera pădurii cu <i>Betula sp.</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Quercus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> medii și mari;						
Lucrări executate: -						
<p>Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (150 kg/ha N, 50 kg/ha P₂O₅, 55 kg/ha K₂O); evitare suprapășunat sau cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație.</p> <p>- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.</p>						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Cucului (5)	Pș 419 - Pș 427	1,28	Pș împădurită	Deal	Neuniform
Altitudine: 520-530m		Expoziție: E	Înclinație: 5-15°	Sol: Gleisol aluvic; Regosol calcaric		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere pădure						
Tip de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase: -						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
1000% Vegetația lemnoasă: extindere tufărișuri de <i>Corylus avelana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> medii sau de pe pârâu cu <i>Salix sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Populus sp.</i> ; extindere lizieră pădure cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Quercus sp.</i> , <i>Betula sp.</i> ...						
<p>Lucrări propuse: curățire repetată de vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 12 kg + <i>Festuca pratensis</i> 5 kg + <i>Phleum pratense</i> 5 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 3 kg + <i>Medicago sativa</i> 5 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (125-150 kg/ha N, 50-60 kg/ha P₂O₅, 75-80 kg/ha K₂O); respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație.</p>						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Cucului (32, 33)	Fn 2033/01 - Fn 2089	2,27	Fn	Deal	Neuniform
Altitudine: 480-520m		Expoziție: S, SE	Inclinație: 5-15°	Sol: Aluvisol eutric molic; Faeoziom tipic; Faeoziom calcaric		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): fânețe păscute de bovine în liziera livezilor vechi, unele abandonate cu extindere de tufărișuri						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
30-50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 15%, <i>Cynosurus cristatus</i> 10%, <i>Festuca sp.</i> (<i>pratensis</i> , <i>rupicola</i> ...) 10%, <i>Bromus sp.</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Phleum pratense</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Briza media</i> ...)						
15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%, <i>Vicia sp.</i> ...						
25 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 10%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Centaurea sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Rhinanthus minor</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Erigeron sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Filipendula sp.</i> , <i>Symphytum officinale</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Carduus sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 5-7 t/ha (0,5-0,7 bovine/ha sau 3-4 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 15-20 t/ha (1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha)						
10-30% Vegetația lemnoasă: diseminări de <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici; unele cu extindere tufărișuri de <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Salix sp.</i> , <i>Cornus sp.</i> medii...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (100-135 kg/ha N, 30-46 kg/ha P ₂ O ₅ , 45-75 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat sau cosit cel puțin o dată pe an. - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Cucului (32, 33 – Anexa 4)	Fn 2107 - Fn 2383/11; Fn 2395/02-Fn 2396/20; Fn 2415-Fn 2441/16	83,30	Fn; Fp	Deal	Neuniform
Altitudine: 485-580m Expoziție: S, SE Înclinație: 5-45° Sol: Faeziom tipic; Preluvsol tipic; Preluvsol stagnogleizat; Regosol calcaric						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): fânețe cu pomi vechi, unele cu garduri vii; unele păscute de ovine, altele abandonate cu extindere de tufărișuri; unele cosite; rare construcții						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca...)</i>						
20-40 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca...)</i> 10%, <i>Holcus lanatus</i> 5%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, <i>Bromus sp.</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Festuca pratensis</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Briza media</i> , <i>Bothriochloa ischaemum...</i>)						
15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%, <i>Vicia sp...</i>						
15 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Geranium pratense</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Erigeron sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Filipendula sp.</i> , <i>Symphytum officinale</i> , <i>Bethonica sp.</i> , <i>Thymus sp...</i>)						
% Plante dăunătoare și toxice: rar <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Carduus sp...</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 3-5 + 10-12 t/ha (0,3-0,5 + 1 bovine/ha sau 2 + 5 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 10-15 + 20 t/ha (1 - 1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha)						
30-60% Vegetația lemnoasă: pomi fructiferi specia <i>Malus</i> , <i>Prunus</i> , <i>Pyrus</i> , <i>Juglans</i> rar; diseminări de <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici; unele cu extindere tufărișuri de <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> medii sau de pe pârâu cu <i>Salix sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Populus sp.</i> ; zone cu extindere lizieră pădure cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Quercus sp.</i> , <i>Betula sp...</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă invazivă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; curățire pomi fructiferi sau defrișare și reîntinerire; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (120-150 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-80 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an sau evitare suprapășunat.						
- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Cucului (33, 35)	Pș 2392; Pș 2403 - Pș 2408	6,04	Pș împădurită	Deal	Neuniform
Altitudine: 520-530m Expoziție: E Înclinație: 5-15° Sol: Stagnosol preluvic; Luvosol tipic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere pădure						
Tip de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase: -						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
% Vegetația lemnoasă: extindere tufărișuri de <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> medii sau de pe pârâu cu <i>Salix sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Populus sp.</i> ; zone cu extindere lizieră pădure cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Quercus sp.</i> , <i>Betula sp.</i> ...						
Lucrări propuse: curățire repetată de vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică și redare pășunatului; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 12 kg + <i>Festuca pratensis</i> 5 kg + <i>Phleum pratense</i> 5 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 3 kg + <i>Medicago sativa</i> 5 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 160-170 kg/ha N, 25-40 kg/ha P ₂ O ₅ , 75-80 kg/ha K ₂ O); respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Cucului (33, 35)	Pș 2411; Pș 2442	6,96; 2,86	Pș ovine	Deal	Uniform
Altitudine: 565-580m		Expoziție: SV	Înclinație: 5-15°	Sol: Regosol tipic		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): tendință extindere pădure						
Tip de pajiște: Agrostis tenuis cu Festuca sp. (rupicola, valesiaca...)						
60 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 20%, <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca...)</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 10%, <i>Cynosurus cristatus</i> 10%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Briza media</i> ...)						
15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
15 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Filipendula sp.</i> , <i>Thymus sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: rar <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Carduus sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 5-7 t/ha (0,5-0,7 bovine/ha sau 3 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 15 - 20 t/ha (1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha)						
10% Vegetația lemnoasă: extindere lizieră pădure cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Quercus sp.</i> , <i>Betula sp.</i> ; diseminări rare de <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici...						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 80 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat sau cosit cel puțin o dată pe an, respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație.						
- cu <u>angajament de agro-mediu</u> : lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Stupul Cisnădiei (6, 7, 9, 10 – Anexa 2)	Fn 431 - Fn 676	58,34	Fn	Deal	Neuniform
Altitudine: 485-525m Expoziție: N, NV Înclinație: 5-15° Sol: Faeoziom cambic stagnic; Faeoziom argic stagnogleizat; Preluvosol stagnogleizat						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere tufărișuri de pe pârâuri; unele păscute de bovine sau ovine						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
55-60 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 20%, <i>Holcus lanatus</i> 15%, <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca...)</i> 10%, <i>Cynosurus cristatus</i> 10%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Briza media...</i>)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Filipendula sp.</i> , <i>Thymus sp...</i>)						
% Plante dăunătoare și toxice: rar <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias...</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 5-7 t/ha (0,5-0,7 bovine/ha sau 3 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 15 - 20 t/ha (1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha)						
10-15 % Vegetația lemnoasă: extindere de pe pârâu cu <i>Salix sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> medii; rari pomi fructiferi speciile <i>Prunus</i> , <i>Malus</i> ; diseminări <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> mici...						
Lucrări executate: parțial nivelat mușuroaie, cosit						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; curățire pomi fructiferi, îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 110-160 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-70 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an sau evitare suprapășunat și supratârilit; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație. - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Fundoaie (11 – Anexa 2)	Fn 682 - Fn 751	13,56	Fn	Deal	Uniform
Altitudine: 485-510m Expoziție: SE Înclinație: 5-15° Sol: Preluvosol stagnogleizat; Luvosol tipic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere tufărișuri de pe pârâu; extindere lizieră pădure; șuri; zonă păscută de bovine						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
60 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 20%, <i>Holcus lanatus</i> 15%, <i>Dactylis glomerata</i> 10%, <i>Festuca sp.</i> (<i>rupicola</i> , <i>pratensis</i> ...) 10%, <i>Cynosurus cristatus</i> 10%, 5% alte graminee (<i>Bromus sp.</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Briza media</i> ...)						
25 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 15%, <i>Medicago sp.</i> 5%, <i>Lotus sp.</i> 3%, <i>Vicia sp.</i> 2%...						
15 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Daucus carota</i> 3%, <i>Plantago sp.</i> 2%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Filipendula sp.</i> , <i>Dianthus sp.</i> , <i>Alchemilla sp.</i> , <i>Rhinanthus sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 10-15 t/ha (1 bovină/ha sau 5-6 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 20-25 t/ha (1,2 bovine/ha sau 6-6,2 ovine/ha)						
10 % Vegetația lemnoasă: extindere de pe pârâu cu <i>Salix sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> medii; extindere lizieră pădure cu <i>Quercus sp.</i> , <i>Carpinus betulus</i> , diseminări rare...						
Lucrări executate: parțial nivelat mușuroaie, cosit						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 145-170 kg/ha N, 45 kg/ha P ₂ O ₅ , 30-70 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an sau evitare suprapășunat; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Stupul Cisnădioarei, La Cruce (12, 13 – Anexa 3)	Fn 753 - Fn 1009	31,85	Fn; Fp	Luncă	Uniformă
Altitudine: 480-500m Expoziție: E Înclinație: 0-5° Sol: Preluvosol stagnogleizat; Luvosol tipic; Luvosol albic; Regosol tipic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): fânețe printre parcele de arabil, unele necultivate; garduri vii; unele plantate cu pomi fructiferi; zonă cu extindere tufăriș și de pe pârâu; unele fertilizate; rare construcții de vară						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 15%, <i>Bromus sp.</i> 10%, <i>Dactylis glomerata</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Phleum pratense</i> , <i>Festuca sp. (rupicola, pratensis...)</i> , <i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Briza media...</i>)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Medicago sp.</i> 5%, <i>Vicia sp.</i> 2%, <i>Lotus sp...</i>						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Daucus carota</i> 4%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Plantago sp.</i> 3%, 5% alte plante (<i>Prunella sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Filipendula sp.</i> , <i>Alchemilla sp.</i> , <i>Geranium pratense...</i>)						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 10-15 t/ha (1 bovină/ha sau 5-6 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 20-25 t/ha (1,2 bovine/ha sau 6-6,2 ovine/ha)						
10 % Vegetația lemnoasă: garduri vii din <i>Carpinus betulus</i> , pomi fructiferi vechi din speciile <i>Prunus</i> , <i>Malus</i> ; extindere tufăriș cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Populus sp. medii...</i>						
Lucrări executate: nivelat mușuroaie, parțial fertilizat, cosit						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; curățire pomi fructiferi și garduri vii; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 145-170 kg/ha N, 45-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 30-80 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație.						
- cu <u>angajament de agro-mediu</u> : lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Stupul Cisnădioarei – Seviș (15)	Fn 1026 - Fn 1118	24,15	Fn, Fp	Luncă	Neuniformă
Altitudine: 460-490m Expoziție: N, E Înclinație: 0-10° Sol: Faeoziom cambic stagnic; Faeoziom tipic; Faeoziom calcaric; Luvosol albic stagnogleizat; Aluvisol eutric; Aluvisol distric; Aluvisol eutric-gleic; Preluvosol tipic; Preluvosol stagnogleizat; Gleiosol calcaric						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): parcele de arabil printre fânețe; garduri vii; unele plantate cu pomi fructiferi; zonă cu extindere tufăriș și de pe pârâu; taluz cu arbori și tufărișuri; unele fânețe sunt fertilizate; construcții de vară						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
40-45 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 20%, <i>Holcus lanatus</i> 15%, <i>Dactylis glomerata</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, pratensis...)</i> 10%, <i>Cynosurus cristatus</i> 10%, 5% alte graminee (<i>Bromus sp.</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Briza media</i> ...)						
25 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 15%, <i>Medicago sp.</i> 5%, <i>Lotus sp.</i> 3%, <i>Vicia sp.</i> 2%...						
15 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Daucus carota</i> 3%, <i>Plantago sp.</i> 2%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Filipendula sp.</i> , <i>Dianthus sp.</i> , <i>Alchemilla sp.</i> , <i>Rhinanthus sp.</i> , <i>Geranium pratense</i> , <i>Knautia arvensis</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 10-15 t/ha (1 bovină/ha sau 5-6 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 20-25 t/ha (1,2 bovine/ha sau 6-6,2 ovine/ha)						
15-20 % Vegetația lemnoasă: 10% extindere de pe pârâu cu <i>Salix sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> medii; extindere tufărișuri cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer campestre</i> , <i>Fraxinus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> mari; pomi fructiferi din speciile <i>Prunus</i> , <i>Malus</i> , <i>Pyrus</i> , <i>Juglans</i> ...						
Lucrări executate: nivelat mușuroaie, parțial fertilizat, cosit						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă invazivă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; curățire pomi fructiferi și garduri vii, îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; drenare zone cu exces de umiditate; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 100-180 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-85 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an sau evitare suprapășunat; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație.						
- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Sibiului (16, 17)	Pș 1192 - Pș 1206/01	15,70	Pș	Deal	Neuniform
Altitudine: 530-550 Expoziție: E Înclinație: 5-15° Sol: Preluvosol tipic; Luvosol stagnogleizat; Gleiosol calcaric						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): pășuni neutilizate cu risc de împădurire; ferigă						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca)</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca)</i> 15%, <i>Cynosurus cristatus</i> 10%, <i>Holcus lanatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Agropyron repens</i> ...)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
25 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 10%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Prunella sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Rumex sp.</i> ...)						
5 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Carduus sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 5-7 t/ha (0,5-0,7 bovine/ha sau 3-4 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 15-20 t/ha (1-1,2 bovine/ha sau 5-6 ovine/ha)						
10 % Vegetația lemnoasă: extindere vegetație lemnoasă din tufărișuri cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp. medii</i>						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 120-160 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-80 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat sau cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Sibiului (18)	Pș 1212	3,96	Pș cu pomi	Deal	Uniform
Altitudine: 480-500m		Expoziție: E	Înclinație: 5-10°	Sol: Preluvosol stagnogleizat		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): plantație de pomi fructiferi						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 15%, <i>Bromus sp.</i> 10%, <i>Dactylis glomerata</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Phleum pratense</i> , <i>Festuca sp. (rupicola, pratensis...)</i> , <i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Briza media...</i>)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Medicago sp.</i> 5%, <i>Vicia sp.</i> 2%, <i>Lotus sp...</i>						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Daucus carota</i> 4%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Plantago sp.</i> 3%, 5% alte plante (<i>Prunella sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Filipendula sp.</i> , <i>Alchemilla sp.</i> , <i>Geranium pratense...</i>)						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 8-10 t/ha (0,8-1 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 20-25 t/ha (1,2 bovine/ha sau 6-6,2 ovine/ha)						
20 % Vegetația lemnoasă: garduri vii din <i>Carpinus betulus</i> , pomi fructiferi din speciile <i>Prunus</i> , <i>Malus</i> ; extindere tufăriș cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> medii...						
Lucrări executate: nivelat mușuroaie, parțial fertilizat, cosit						
Lucrări propuse: - reglementare categorie de folosință; - curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; curățire pomi fructiferi și garduri vii; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (150 kg/ha N, 30 kg/ha P ₂ O ₅ , 40 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an. - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Sibiului (18)	Fn 1217 - Fn 1279	23,65	Fn, Fp	Deal	Denivelat
Altitudine: 460-515m Expoziție: V, E, S Înclinație: 3-35° Sol: Faeoziom tipic; Faeoziom calcaric; Luvosol tipic; Luvosol albic; Luvosol stagnogleizat; Preluvosol tipic; Preluvosol stagnogleizat; Stagnosol preluvic; Gleiosol tipic; Gleiosol calcaric						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere tufărișuri de pe pârauri; garduri vii; unele plantate cu pomi fructiferi; unele fânețe au construcții de locuințe; zone cu exces de umiditate						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
40-50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, pratensis...)</i> 10%, <i>Dactylis glomerata</i> 5%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Bromus sp., Phleum pratense, Agropyron repens, Anthoxanthum odoratum, Briza media...</i>)						
15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%, <i>Vicia sp...</i>						
15 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Daucus carota</i> 3%, <i>Plantago sp.</i> 2%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp., Prunella sp., Centaurea sp., Stellaria sp., Carex sp., Chrysanthemum sp., Agrimonia eupatoria, Galium sp., Cichorium intybus, Filipendula sp., Dianthus sp., Alchemilla sp., Rhinanthus sp., Geranium pratense, Knautia arvensis, Juncus sp...</i>)						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 5-7 t/ha (0,5-0,7 bovine/ha sau 3 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 15-20 t/ha (1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha)						
20-30 % Vegetația lemnoasă: 10-20% pomi fructiferi din speciile <i>Prunus, Malus, Pyrus, Juglans</i> ; extindere de pe pârâu cu <i>Salix sp., Alnus sp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa</i> medii; extindere tufărișuri cu <i>Carpinus betulus, Acer campestre, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus sp...</i>						
Lucrări executate: parțial fertilizat, cosit						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă invazivă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; curățire pomi fructiferi și garduri vii, îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 100-170 kg/ha N, 25-80 kg/ha P ₂ O ₅ , 45-85 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație. - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Șopa, Podul I, Podul II (19); În Luncă	Fn 1281 – Pș 1324/01; Fn 1412; Fn 1412/04	69,79; 13,30; 0,40	Fn, Pș	Deal	Denivelat
Altitudine: 417-455m Expoziție: E, SE Înclinație: 3-35° Sol: Regosol calcaric; Aluvisol eutric; Preluvosol tipic; Preluvosol rodic; Preluvosol stagnogleizat; Luvosol stagnogleizat; Gleiosol tipic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere tufărișuri; zone cu exces de umiditate, stuf și pipirig; zone cu pomi fructiferi vechi; puține fertilizate; rare construcții						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Bromus sp.</i>						
25-45 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Bromus sp.</i> 10%, <i>Holcus lanatus</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, pratensis...)</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Dactylis glomerata</i> , <i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Briza media...</i>)						
10-20 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> , <i>Medicago sp.</i> , <i>Lotus sp.</i> , <i>Vicia sp...</i>						
15 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Daucus carota</i> 3%, <i>Plantago sp.</i> 2%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Filipendula sp.</i> , <i>Dianthus sp.</i> , <i>Alchemilla sp.</i> , <i>Rhinanthus sp.</i> , <i>Geranium pratense</i> , <i>Knautia arvensis...</i>)						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Phragmites sp.</i> , <i>Hypericum perforatum...</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 3-5 t/ha, + 1-3 t/ha în zone cu tufărișuri, + 8-10 t/ha în zone fertilizate (0,3-0,5 + 0,8 bovine/ha sau 2-3 + 4 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 10-20 t/ha (1-1,2 bovine/ha sau 5-6 ovine/ha)						
20-50 % Vegetația lemnoasă: extindere tufărișuri cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer campestre</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> , <i>Rosa canina</i> ; pomi fructiferi vechi speciile <i>Prunus</i> , <i>Malus</i> , <i>Juglans</i>						
Lucrări executate: parțial cosit						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; drenare zone cu exces de umiditate; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 125-160 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 45-85 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație. - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	În Luncă, La Muniții (21)	Fn 1430 - Fn 1475	6,11	Fn	Deal	Denivelat
Altitudine: 415-430m Expoziție: N Înclinație: 0-5° Sol: Gleiosol tipic; Aluvisol eutric; Faeoziom calcaric; Preluvosol stagnoleizat						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): în lungul pâraului și a căii ferate; zone antropice pe care s-au depus materiale; extindere tufărișuri; zone cu exces de umiditate						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
15-45 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca...)</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum...</i>						
5 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> , <i>Medicago sp.</i> , <i>Lotus sp.</i> , <i>Vicia sp...</i>						
10 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Plantago sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus...</i>						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Phragmites sp.</i> , <i>Hypericum perforatum...</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
50-70 % Vegetația lemnoasă: extindere tufărișuri cu <i>Salix sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> , <i>Rosa canina</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: oprirea extinderii pe parcele și curățire repetată de vegetație lemnoasă până la malul pâraului, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 12 kg + <i>Festuca pratensis</i> 6 kg + <i>Phleum pratense</i> 5 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 3 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 100-150 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-85 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Viilor (22, 26)	Pș 1477; Fn 1483; Pș 1488 - Pș 1524	2,77; 0,40; 85,12	Pș ovine	Deal	Uniform
Altitudine: 430-490m Expoziție: V, NV Înclinație: 5-15° Sol: Aluvisol eutric; Preluvosol tipic; Preluvosol stagnogleizat; Luvosol tipic; Luvosol stagnogleizat; Gleiosol tipic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): păscută de ovine și bovine sau cosită; zone cu grădini cu pomi fructiferi și garduri vii; construcții; zone cu eroziuni; extindere pădure						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 20%, <i>Holcus lanatus</i> 15%, <i>Bromus sp.</i> 10%, <i>Dactylis glomerata</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Phleum pratense</i> , <i>Festuca sp. -rupicola</i> , <i>pratensis</i> , <i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Briza media</i> ...)						
20 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 5%, <i>Lotus sp.</i> 4%; <i>Vicia sp.</i> 1%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 7%, <i>Prunella sp.</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 3%, 5% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Filipendula sp.</i> , <i>Alchemilla sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 8-10 t/ha (0,8-1 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 20-25 t/ha (1,2 bovine/ha sau 6-6,2 ovine/ha); în zonele cu eroziuni – 3-5 t/ha						
10 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus sp.</i> ; garduri vii din <i>Carpinus betulus</i> , <i>Salix sp.</i> ; pomi fructiferi din speciile <i>Prunus</i> , <i>Malus</i> ; diseminări de <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> medii mai ales pe zone cu eroziuni...						
Lucrări executate: nivelat mușuroaie, parțial fertilizat, cosit						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică și păstrare pe zone eroziuni pentru protecție și arbori pentru umbră; curățire pomi fructiferi și garduri vii; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 120-170 kg/ha N, 30-70 kg/ha P ₂ O ₅ , 30-85 kg/ha K ₂ O); folosire rațională a pajiștii; evitarea păscutului pe timp umed; limitarea trecerii cu animalele pe eroziuni – supraînsămânțare cu specii locale; evitarea supratârâlit sau cosit cel puțin o dată pe an.						
- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Viilor (26)	Fn 1688 - Fn 1716	3,57	Fn	Deal	Denivelat
Altitudine: 435-460m Expoziție: S Inclinație: 3-10° Sol: Preluvosol tipic; Preluvosol stagnogleizat; Eutricambosol stagnogleizat; Gleiosol calcaric; Gleiosol aluvic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): în livadă veche; extindere tufăriș						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
15-35 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca...)</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum...</i>						
5 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> , <i>Medicago sp.</i> , <i>Lotus sp...</i>						
10 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Plantago sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus...</i>						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 3-5 t/ha (0,3-0,5 bovină/ha sau 2 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 10-15 t/ha (1 bovină/ha sau 5 ovine/ha)						
50-70 % Vegetația lemnoasă: extindere tufărișuri cu <i>Salix sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> , <i>Rosa canina</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: oprirea extinderii pe parcele și curățire repetată de vegetație lemnoasă până la malul pârâului, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 12 kg + <i>Festuca pratensis</i> 6 kg + <i>Phleum pratense</i> 5 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 3 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (145-160 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-85 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an. - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Tocile (23, 25)	Fn 1528 - Fn 1687/02	6,69	Fn	Deal	Neuniform
Altitudine: 415-460m Expoziție: S, V Înclinație: 3-10° Sol: Regosol tipic; Gleiosol aluvic; Gleiosol tipic; Faeoziom cambic; Preluvosol tipic; Luvosol stagnogleizat						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): în pădure; în livadă veche; extindere tufăriș; pe malul lacurilor						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Holcus lanatus</i>						
25-55 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca...)</i> 10%, <i>Agropyron repens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum...</i>						
5 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> , <i>Medicago sp.</i> , <i>Lotus sp...</i>						
10 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> , <i>Plantago sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Daucus carota...</i>						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 3-5 t/ha (0,3-0,5 bovină/ha sau 2 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 10-15 t/ha (1 bovină/ha sau 5 ovine/ha); în parcelele cu procent mare de tufăriș, producția de masă verde nu depășeșet 1 t/ha.						
30-60 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure cu <i>Quercus sp.</i> , <i>Carpinus betulus...</i> ; extindere tufărișuri cu <i>Salix sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> , <i>Rosa canina...</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: oprirea extinderii pe parcele și curățire repetată de vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 12 kg + <i>Festuca pratensis</i> 6 kg + <i>Phleum pratense</i> 5 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 3 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (110-160 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-85 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an. - cu <u>angajament de agro-mediu</u> : lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Florilor (27)	Fn 1719 – Pș 1805/01	34,42	Fn cu pomi	Deal	Denivelat
Altitudine: 455-510m Expoziție: E, NE Înclinație: 5-15° Sol: Preluvosol tipic; Preluvosol stagnogleizat; Faeoziom argic-vertic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): grădini cu pomi fructiferi vechi; puține fertilizate; garduri vii; rare construcții						
Tip de pajiște: <i>Bromus sp.</i> cu <i>Trifolium sp.</i>						
25-35 % Graminee: <i>Bromus sp.</i> 10%, <i>Holcus lanatus</i> 5%, <i>Dactylis glomerata</i> 5%, <i>Festuca pratensis</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Agrostis tenuis</i> , <i>Phleum pratense</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Briza media</i> ...)						
25 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 7%, <i>Lotus sp.</i> 5%, <i>Vicia sp.</i> 3%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Galium sp.</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, 5% alte plante (<i>Taraxacum sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Filipendula sp.</i> , <i>Dianthus sp.</i> , <i>Alchemilla sp.</i> , <i>Geranium pratense</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Salvia sp.</i> , <i>Hypericum perforatum</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 8-10 t/ha (0,8-1 bovine/ha sau 4 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrării propuse producție masă verde 20-25 t/ha (1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha)						
20-30 % Vegetația lemnoasă: pomi fructiferi vechi speciile <i>Prunus</i> , <i>Malus</i> , <i>Juglans</i> ; garduri vii cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Acer campestre</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> , <i>Rosa canina</i> ;						
Lucrări executate: cosit						
Lucrări propuse: curățire pomi fructiferi și garduri vii; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 110-160 kg/ha N, 35-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-80 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație. - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Dealul Grigore (28, 29)	Fn 1822/02 – Pș 2658/01	1,87	Fn împădurită	Deal	Denivelat
Altitudine: 480-500m Expoziție: S, SE Înclinație: 5-10° Sol: Preluvosol tipic; Preluvosol stagnogleizat; Gleiosol tipic, Gleiosol aluvic; Regosol calcaric						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): în lungul pâraurilor; împădurire prin extindere tufărișuri; zone cu exces de umiditate						
Tip de pajiște: -						
5 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Festuca sp.</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> ...						
% Leguminoase: -						
5 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Plantago sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Carex</i> ...						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
90 % Vegetația lemnoasă: extindere tufărișuri cu <i>Salix sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> , <i>Rosa canina</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: oprirea extinderii pe parcele și curățire repetată de vegetație lemnoasă până la malul pâraului, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 12 kg + <i>Festuca pratensis</i> 6 kg + <i>Phleum pratense</i> 5 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 3 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 120-160 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-80 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Paradis (30, 31)	Fn 1948 – Pș 1999/02	1,15	Fn împădurită	Deal	Denivelat
Altitudine: 480-500m Expoziție: E Înclinație: 5-10° Sol: Preluvosol stagnogleizat; Luvosol tipic; Gleiosol tipic, Gleiosol aluvic; Regosol calcaric						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): în lungul pâraurilor; împădurire prin extindere tufărișuri; zone cu exces de umiditate						
Tip de pajiște: -						
5 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Festuca sp.</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> ...						
% Leguminoase: -						
5 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Plantago sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Carex</i> ...						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
90 % Vegetația lemnoasă: extindere tufărișuri cu <i>Salix sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> , <i>Rosa canina</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: oprirea extinderii pe parcele și curățire repetată de vegetație lemnoasă până la malul pâraului, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 12 kg + <i>Festuca pratensis</i> 6 kg + <i>Phleum pratense</i> 5 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 3 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 150-170 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 30-75 kg/ha K ₂ O); cosit cel puțin o dată pe an.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Paradis (30, 31)	Fn 2004/02 - Fn 2028/02	2,14	Fn	Deal	Neuniform
Altitudine: 480-520m Expoziție: N Înclinație: 5-10° Sol: Preluvsol tipic; Luvsol tipic; Gleiosol tipic; Gleiosol calcaric						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): în livezi vechi, pe pârâuri seci; extindere tufărișuri						
Tip de pajiște: <i>Holcus lanatus</i> cu <i>Agrostis tenuis</i>						
45 % Graminee: <i>Holcus lanatus</i> 15%, <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Bromus sp.</i> 5%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Festuca sp.</i> - <i>rupicola</i> , <i>pratensis</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> ...)						
20 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Medicago sp.</i> 5%, <i>Lotus sp.</i> 4%; <i>Vicia sp.</i> 1%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 7%, <i>Prunella sp.</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 3%, 5% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Filipendula sp.</i> , <i>Alchemilla sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 5-7 t/ha (0,5-0,7 bovină/ha sau 3 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 15-20 t/ha (1 bovină/ha sau 5-6 ovine/ha)						
15 % Vegetația lemnoasă: extindere tufărișuri și diseminări cu <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> ...						
Lucrări executate: parțial cosit						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 145-170 kg/ha N, 45-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 30-70 kg/ha K ₂ O); folosire rațională a pajiștii; cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație.						
- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Lăcșoare (36, 37,38)	Fn 2492	3,92	Fn	Deal	Denivelat
Altitudine: 545-580m Expoziție: SE Înclinație: 10-45° Sol: Faeziom argic stagnogleizat						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): livezi vechi; extindere tufărișuri; zone cu exces de umiditate; păscută de ovine						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Festuca sp. (rupicola, pratensis, valesiaca...)</i>						
35 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Festuca sp. (rupicola, pratensis, valesiaca...)</i> 10%, <i>Holcus lanatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Bromus sp.</i> , <i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum...</i>)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
15 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Prunella sp.</i> 2%, 5% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Bethonica sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Mentha sp...</i>)						
% Plante dăunătoare și toxice: rar <i>Carduus sp.</i> , <i>Veratrum album...</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 3-5 t/ha (0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 10-15 t/ha (1 bovină/ha sau 5 ovine/ha)						
40% Vegetația lemnoasă: pomi fructiferi vechi; extindere tufărișuri și diseminări cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina...</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; drenare zone cu exces de umiditate; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (120 kg/ha N, 30 kg/ha P ₂ O ₅ , 50 kg/ha K ₂ O); folosire rațională a pajiștii; evitare suprapășunat sau cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație. - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Lăcșoare (36, 37, 38)	Fn 2504 – Fn 2688	55,04	Fn, Fn cu pomi	Deal	Denivelat
Altitudine: 530-650m Expoziție: S, SE Înclinație: 5-35° Sol: Regosol tipic; Preluvosol tipic; Preluvosol stagnogleizat; Faeoziom argic stagnogleizat						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): fânețe și grădini cu pomi fructiferi vechi, unele cu construcții de locuit sau pentru animale; unele cu extindere tufărișuri; unele cosite, altele păscute de ovine; zone cu extindere pădure						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Festuca sp. (rupicola, pratensis, valesiaca...)</i>						
35 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Festuca sp. (rupicola, pratensis, valesiaca...)</i> 10%, <i>Holcus lanatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Bromus sp.</i> , <i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum...</i>)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
15 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Prunella sp.</i> 2%, 5% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Bethonica sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Mentha sp...</i>)						
% Plante dăunătoare și toxice: rar <i>Carduus sp.</i> , <i>Veratrum album...</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 3-5 t/ha (0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 10-15 t/ha (1 bovină/ha sau 5 ovine/ha)						
20-50 % Vegetația lemnoasă: pomi fructiferi vechi din speciile <i>Prunus</i> , <i>Malus</i> , <i>Pyrus</i> , <i>Juglans</i> ; extindere tufărișuri și diseminări cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> medii și mari...						
Lucrări executate: parțial cosit						
Lucrări propuse: curățire pomi fructiferi și vegetație lemnoasă invazivă; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 120-160 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-80 kg/ha K ₂ O); folosire rațională a pajiștii; evitare suprapășunat sau cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație. - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Cisnădioara (După Ștrand - 39)	Fn 2698/02; Pș 2726; Pșpd 2732; Pșpd 2733/1	0,15; 0,07; 0,06; 0,93	Pș, Fn împădurită	Deal	Neuniform
Altitudine: 540-630m Expoziție: N, NV Înclinație: 5-25° Sol: Aluvisol eutric, entic-litic; Luvosol stagnogleizat						
Datele staționale suplimentare: împădurită prin extindere pădure, consistență peste 04						
Tipul de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase:						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
100 % Vegetația lemnoasă: <i>Carpinus betulus</i> , <i>Quercus sp.</i> , <i>Pinus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp...</i>						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: introducere în Amenajament silvic sau curățire vegetație lemnoasă cu acord Ocol silvic pentru vegetație silvică, pentru redare pășunatului; păstrare protecție împotriva eroziunii, cu păstrare de arbori izolați sau grupurile de arbori ca zone de refugiu pentru animale; fertilizare anuală, însămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 12 kg + <i>Festuca pratensis</i> 6 kg + <i>Phleum pratense</i> 5 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 3 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); folosire rațională a pajiștii.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Cisnădioara (După Ștrand - 39)	Pș 2702; Pș 2712/01 - Pș 2712/05	0,12; 0,79	Pș ovine, Fn	Deal	Neuniform
Altitudine: 570-615m		Expoziție: N, S, V	Inclinație: 3-10°	Sol: Aluvisol eutric		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere tufăriș de pe pârâu și pădure; zone cu pipirig; diseminări de vegetație lemnoasă						
Tip de pajiște: Agrostis tenuis cu Agropyron repens						
20-40 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 10%, <i>Agropyron repens</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, rubra)</i> 10%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Holcus lanatus</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> , <i>Bothriochloa ischaemum</i> ...)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Lotus sp.</i> 3%, <i>Medicago sp.</i> 2%...						
18 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Taraxacum sp.</i> 3%, 5% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Cichorium intybus</i> ...)						
2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Eryngium campestre</i> , <i>Carduus sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,5-0,7 bovine/ha sau 3 ovine/ha (producție masă verde 5-7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha (producție masă verde 15-20 t/ha)						
30-50 % Vegetația lemnoasă: 15-20% extindere tufăriș de pe pârâu și pădure cu <i>Salix sp.</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus avelana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Rubus sp.</i> medii și mari; diseminări cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică și redare pășunatului, cu pastrare de arbori izolați sau grupurile de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (150 kg/ha N, 30-50 kg/ha P ₂ O ₅ , 55-85 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea pășcutului pe timp umed - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Cisnădioara (După Strand - 39)	Pș 2724; Pș 2733/2; Pș 2740/4; Pș 2746	0,30; 0,12; 0,92; 0,45	Pășune ovine, caprine	Deal	Neuniform
Altitudine: 550-610m		Expoziție: V	Inclinație: 5-25°	Sol: Districambosol tipic; Luvosol stagnogleizat		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere pădure; zone cu exces de umiditate; fermă de capre; zone cu săpături de mistreți; zone cu ferigă; foarte păscută						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca, pratensis)</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 20%, <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca, pratensis)</i> 15%, <i>Agropyron repens</i> 5%, <i>Bromus sp.</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> ...)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
23 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 7%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Juncus sp.</i> 3%, <i>Taraxacum sp.</i> 2%, 5% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Betonica sp.</i> ...)						
2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Pteridium sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,5-0,7 bovine/ha sau 3-4 ovine, caprine/ha (producție masă verde 5-7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine, caprine/ha (producție masă verde 15-20 t/ha)						
20 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure și diseminări cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> medii și mari...						
Lucrări executate: nivelare mușuroaie						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică și redare pășunatului, cu pastrare de arbori izolați sau grupurile de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; drenare zone cu exces de umiditate; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-5 t/ha CaCO ₃ , 150-160 kg/ha N, 50 kg/ha P ₂ O ₅ , 55-80 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratărlit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație; - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Cisnădioara (După Ștrand - 39)	Fn 2738; Fn 2741; Fn 2750	0,90; 2,73; 1,50	Fn cu pomi	Deal	Uniform
Altitudine: 515-540m Expoziție: N Înclinație: 5-15° Sol: Districambosol tipic; Luvosol tipic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): fânețe și grădini cu pomi fructiferi vechi; unele cu construcții de locuit sau pentru animale; extindere pădure						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Festuca sp. (rupicola, pratensis, valesiaca...)</i>						
50 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Festuca sp. (rupicola, pratensis, valesiaca...)</i> 15%, <i>Holcus lanatus</i> 10%, <i>Dactylis glomerata</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Bromus sp.</i> , <i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Agropyron repens</i> , <i>Anthoxanthum odoratum...</i>)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Medicago sp.</i> 3%, <i>Lotus sp.</i> 2%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Prunella sp.</i> 2%, 5% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Chrysanthemum sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Galium sp.</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Bethonica sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Mentha sp...</i>)						
% Plante dăunătoare și toxice: rar <i>Carduus sp.</i> , <i>Veratrum album...</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 3-5 t/ha (0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse producție masă verde 10-15 t/ha (1 bovină/ha sau 5 ovine/ha)						
20 % Vegetația lemnoasă: pomi fructiferi vechi din speciile <i>Prunus</i> , <i>Malus</i> , <i>Pyrus</i> , <i>Juglans</i> ; extindere tufărișuri și pădure cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rosa canina</i> medii și mari...						
Lucrări executate: parțial cosit						
Lucrări propuse: curățire pomi fructiferi și vegetație lemnoasă invazivă; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 6 kg + <i>Festuca pratensis</i> 3 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lotus corniculatus</i> 2 kg + <i>Medicago sativa</i> 3 kg); fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-3 t/ha CaCO ₃ , 120-160 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-80 kg/ha K ₂ O); folosire rațională a pajiștii; evitare suprapășunat sau cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumurilor de exploatație. - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Cisnădioara (După Strand - 39)	Pș 2730; Pș 2742/1 - Pș 2742/3	0,63; 2,21	Pășune ovine, caprine	Deal	Neuniform
Altitudine: 550-585m Expoziție: V Inclinație: 5-10° Sol: Districambosol tipic; Luvosol tipic						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere pădure; zone cu exces de umiditate și pipirig; zone cu ferigă; foarte păscută						
Tip de pajiște: <i>Agrostis tenuis</i> cu <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca, pratensis)</i>						
30 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca, pratensis)</i> 10%, <i>Agropyron repens</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Cynosurus cristatus</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> ...)						
5 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 3%, <i>Medicago sp.</i> 1%, <i>Lotus sp.</i> 1%...						
15 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Juncus sp.</i> 3%, 4% alte plante (<i>Prunella sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centaurea sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Rumex sp.</i>)						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Pteridium sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine, caprine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse 1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine, caprine/ha (producție masă verde 15-20 t/ha)						
50 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure și diseminări cu <i>Carpinus betulus</i> , <i>Pinus sp.</i> , <i>Corylus avelana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> medii și mari...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică și redare pășunatului, cu pastrare de arbori izolați sau grupurile de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; drenare zone cu exces de umiditate; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (5 t/ha CaCO ₃ , 160 kg/ha N, 50 kg/ha P ₂ O ₅ , 55 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratărlit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatare;						
- cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Cisnădioara (După Ștrand - 39)	Pș 2710; Tf 2729; Pș 2744/1 - Pș 2745; Tf 2751 - Np 2758	0,13; 0,19; 2,48; 0,38	Tf; Pș semiimpădurite Np	Deal	Uniform
Altitudine: 545-565m		Expoziție: N, NV	Înclinație: 5-10°		Sol: Aluvisol eutric;	
Districambosol tipic; Stagnosol preluvic						
Datele staționale suplimentare: maturizarea diseminărilor și vegetației lemnoase extinse de pe pârâuri						
Tipul de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase:						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
100 % Vegetația lemnoasă: pe pârâu <i>Alnus sp.</i> , <i>Salix sp.</i> ; din pădure <i>Carpinus betulus</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> ...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă cu acord Ocol silvic pentru vegetație silvică, pentru redare pășunatului; păstrare protecție împotriva eroziunii, cu oprirea înaintării în parcelele vecine; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată, nivelare, fertilizare și însămânțare (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 10 kg + <i>Festuca pratensis</i> 8 kg + <i>Phleum pratense</i> 5 kg+ <i>Lolium perenne</i> 2 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 3 kg).						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Cisnădioara (După Ștrand - 39)	Pș 2759	22,85	Pș, Fn ovine, caprine	Deal	Neuniform
Altitudine: 530-560m		Expoziție: N, S	Înclinație: 5-35°		Sol: Preluvosol tipic; Luvosol tipic	
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere pădure; diseminări de vegetație lemnoasă						
Tip de pajiște: Agrostis tenuis cu Agropyron repens						
5-40 % Graminee: <i>Agrostis tenuis</i> 10%, <i>Agropyron repens</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, rubra)</i> 10%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Holcus lanatus</i> , <i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Bromus sp.</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> , <i>Bothriochloa ischaemum</i> ...)						
5-10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 5%, <i>Lotus sp.</i> 3%, <i>Medicago sp.</i> 2%...						
10-20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Taraxacum sp.</i> 3%, 5% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella sp.</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Cichorium intybus</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Eryngium campestre</i> , <i>Carduus sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: producție masă verde 1-3 t/ha în condiții actuale (0,2-0,3 bovine/ha sau 2 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, producție masă verde 10-15 t/ha (1 bovină/ha sau 5 ovine/ha)						
30-80 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure cu <i>Salix sp.</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Pinus sp.</i> , <i>Corylus avelana</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Rubus sp.</i> medii și mari; diseminări cu <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> mici						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică și redare pășunatului, cu pastrare de arbori izolați sau grupurile de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare și însămânțare unde este cazul cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (150 kg/ha N, 30-50 kg/ha P ₂ O ₅ , 55-85 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat și supratărlit sau cosit cel puțin o dată pe an - cu angajament de agro-mediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T.	Trupul de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categoria de folosință	Unitatea de relief	Configurația
Cisnădie	Ihoala (40); Măgura Cisnădioarei (42, 43)	Pș 2771; Pș 2774; Fn 2987	0,20; 0,38; 0,23	Pș împădurită	Deal	Denivelat
Altitudine: 540-560m Expoziție: N Înclinație: 5-25° Sol: Preluvosol stagnogleizat						
Datele staționale suplimentare: împădurire cu consistență mai mare de 04, prin maturizarea diseminărilor, extinderii pădurii și a vegetației lemnoase de pe pârâuri						
Tipul de pajiște: -						
% Graminee: -						
% Leguminoase:						
% Diverse plante: -						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: -						
100 % Vegetația lemnoasă: <i>Carpinus betulus</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Quercus sp.</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> ...						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă cu acord Ocol silvic pentru vegetație silvică, pentru redare pășunatului; păstrare protecție împotriva eroziunii unde este cazul, cu oprirea înaintării în parcelele vecine; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată, nivelare, fertilizare și însămânțare (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 10 kg + <i>Festuca pratensis</i> 8 kg + <i>Phleum pratense</i> 6 kg + <i>Lolium perenne</i> 2 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg + <i>Trifolium repens</i> 3 kg).						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Ihoala (40)	Fn 2776/01- Fn 2826/02	4,75	Fn păscută	Deal	Neuniform
Altitudine: 550-590m Expoziție: S, SE Înclinație: 5-25° Sol: Districambosol tipic; Preluvosol stagnogleizat						
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): tendință extindere pădure; zone cu exces de umiditate și pipirig; săpături de mistreți; drumuri de exploatație greu practicabile pe timp umed; adăpost de animale						
Tip de pajiște: <i>Holcus lanatus</i> cu <i>Agrostis tenuis</i>						
60 % Graminee: <i>Holcus lanatus</i> 15%, <i>Agrostis tenuis</i> 15%, <i>Cynosurus cristatus</i> 10%, <i>Festuca sp. (rupicola, valesiaca, pratensis)</i> 5%, <i>Anthoxanthum odoratum</i> 5%, <i>Bromus sp.</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Agropyron repens</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Deschampsia chaespitosa</i> , <i>Lolium perenne</i> ...)						
10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 3%, <i>Medicago sp.</i> 1%, <i>Lotus sp.</i> 1%...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 5%, <i>Juncus sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Prunella sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Centarurea sp.</i> , <i>Ranunculus sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Thymus sp.</i> , <i>Campanula sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: -						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 5-7 t/ha (0,5-0,7 bovine/ha sau 3-4 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, producție masă verde 15-20 t/ha (1-1,2 bovine/ha sau 6 ovine/ha)						
10 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure și diseminări cu <i>Betula sp.</i> , <i>Corylus avelana</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus sp.</i> mici și medii...						
Lucrări executate: parțial nivelare mușuroaie și curățire de vegetație lemnoasă						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică și redare pășunatului, cu păstrare pe zone erodate și arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; drenare zone cu exces de umiditate; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Dactylis glomerata</i> 5 kg + <i>Festuca pratensis</i> 4 kg + <i>Phleum pratense</i> 3 kg + <i>Lolium perenne</i> 1 kg + <i>Poa pratensis</i> 1 kg + <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (0-5 t/ha CaCO ₃ , 150-160 kg/ha N, 30-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 40-80 kg/ha K ₂ O); evitarea suprapășunat și supratărlit sau cosit cel puțin o dată pe an; evitarea păscutului pe timp umed și a trecerilor repetate pe zone cu eroziuni; construcție adăpătoare din beton cu pietriș, conform standardelor și curățarea și dezinfectarea periodică a adăpătoarei ei și a zonei din jur; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație. - cu angajament de agromediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Măgura Cisnădioarei (42, 43)	Fn 2843 - Pș 2860	7,34	Pș ovine	Versant deal	Uniform
Altitudine: 580-820m		Expoziție: N	Înclinație: 10-40°	Sol: Districambosol tipic		
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): tendință de extindere târșă; extindere pădure						
Tip de pajiște: <i>Festuca sp. (ovina, rubra)</i> cu <i>Agrostis tenuis</i>						
45 % Graminee: <i>Festuca sp. (ovina, rubra)</i> 20%, <i>Agrostis tenuis</i> 10%, <i>Deschampsia sp.</i> 10%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Briza media</i> ...)						
% Leguminoase: <i>Trifolium repens</i> ...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Prunella sp.</i> 5%, <i>Thymus sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Plantago sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Campanula sp.</i> , <i>Bryophita sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: rar <i>Veratrum album</i> , <i>Hypericum sp.</i>						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 3-5 t/ha (0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, producție masă verde 8-10 t/ha (0,8-1 bovine/ha sau 5 ovine/ha)						
25 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure și diseminări cu <i>Fagus sp.</i> , <i>Betula sp.</i> medii și mari						
Lucrări executate: -						
<p>Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare (târșă nu este dăunătoare, dar nu are valoare nutritivă – se curăță cu mulcerul, se târleşte și se însămânțează cu amestec de semințe) și vegetație lemnoasă, oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (5 t/ha CaCO₃, 160 kg/ha N, 50 kg/ha P₂O₅, 55 kg/ha K₂O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație;</p> <p>- cu angajament de agromediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.</p>						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Valea Sadului (50, 51)	Fn 3250 – Fn 3300	6,81	Fn	Vale	Neuniformă
Altitudine: 585-600m		Expoziție: E	Inclinație: 10-40°		Sol: Aluvisol distric-litic; Disticambosol tipic	
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): malul râului Sadu și margine drum județean; extindere pădure; suprapășunată de bovine; piatră la suprafață						
Tip de pajiște: <i>Festuca sp. (ovina, rubra)</i> cu <i>Agrostis tenuis</i>						
45 % Graminee: <i>Festuca sp. (ovina, rubra)</i> 20%, <i>Agrostis tenuis</i> 10%, <i>Holcus lanatus</i> 5%, <i>Cynosurus cristatus</i> 5%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Deschampsia sp.</i> , <i>Briza media</i> ...)						
% Leguminoase: <i>Trifolium repens</i> , <i>Lotus corniculatus</i> ...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Prunella sp.</i> 5%, <i>Thymus sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Plantago sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Juncus sp.</i> , <i>Taraxacum sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: <i>Hypericum sp.</i> , <i>Pteridium sp.</i> , <i>Carduus sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 1-3 t/ha (0,2 bovine/ha sau 2 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, producție masă verde 8-10 t/ha (0,8-1 bovine/ha sau 5 ovine/ha)						
25 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure și diseminări cu <i>Fagus sp.</i> , <i>Betula sp.</i> , <i>Picea sp.</i> , <i>Alnus sp.</i> , <i>Salix sp.</i> medii și mari						
Lucrări executate: -						
Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă, oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (5 t/ha CaCO ₃ , 160-180 kg/ha N, 50-60 kg/ha P ₂ O ₅ , 55-85 kg/ha K ₂ O); evitare suprapășunat sau cosit cel puțin o dată pe an; îngrădirea limitei cu DN pentru evitarea trecerii animalelor pe carosabil.						
- cu <u>angajament de agromediu</u> : lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.						

U.A.T	Trup de pajiște	Parcela descriptivă	Suprafața (ha)	Categorie de folosință	Unitate de relief	Configurație
Cisnădie	Valea Sadului (50, 51)	Fn 3318	4,71	Fn	Coamă deal	Uniformă
Altitudine: 985-1010m		Expoziție: S, SE		Înclinație: 10-35°		Sol: Districambosol tipic
Date staționale suplimentare (dacă este cazul): extindere târșă; extindere pădure; păscută de ovine						
Tip de pajiște: <i>Festuca sp. (ovina, rubra)</i> cu <i>Agrostis tenuis</i> și <i>Deschampsia sp.</i>						
45 % Graminee: <i>Festuca sp. (ovina, rubra)</i> 20%, <i>Agrostis tenuis</i> 10%, <i>Deschampsia sp.</i> 10%, 5% alte graminee (<i>Anthoxanthum odoratum</i> , <i>Holcus lanatus</i> , <i>Briza media</i> ...)						
% Leguminoase: <i>Trifolium repens</i> ...						
20 % Diverse plante: <i>Achillea millefolium</i> 5%, <i>Prunella sp.</i> 5%, <i>Thymus sp.</i> 5%, 5% alte plante (<i>Plantago sp.</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Stellaria sp.</i> , <i>Carex sp.</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Campanula sp.</i> , <i>Bryophita sp.</i> ...)						
% Plante dăunătoare și toxice: rar <i>Veratrum album</i> , <i>Hypericum sp.</i> ...						
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei: 100%						
Încărcarea cu animale: în condiții actuale, producție masă verde 3-5 t/ha (târșă poate să ajungă la 7-9 t/ha, dar nu este valoroasă - 0,3-0,5 bovine/ha sau 2-3 ovine/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, producție masă verde 8-10 t/ha (0,8-1 bovine/ha sau 5 ovine/ha)						
30 % Vegetația lemnoasă: extindere pădure și diseminări cu <i>Fagus sp.</i> , <i>Betula sp.</i> medii, mari și <i>Picea sp.</i> Mici						
Lucrări executate: -						
<p>Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare (târșă nu este dăunătoare, dar nu are valoare nutritivă – se curăță cu mulcerul, se târleşte și se însămânțează cu amestec de semințe) și vegetație lemnoasă, oprirea extinderii pădurii spre pășune, cu acord Ocol silvic pentru vegetație lemnoasă silvică, cu păstrare de arbori izolați sau grupuri de arbori ca zone de refugiu pentru animale; îndepărtare vegetație lemnoasă tăiată; nivelare mușuroaie; supraînsămânțare cu amestecuri de specii (la 1ha: <i>Phleum pratense</i> 4 kg + <i>Festuca rubra</i> 4 kg + <i>Poa pratensis</i> 2 kg+ <i>Trifolium repens</i> 2 kg); folosire rațională a pajiștii; fertilizare anuală naturală cu gunoi de grajd sau chimică (5 t/ha CaCO₃, 160 kg/ha N, 50 kg/ha P₂O₅, 55 kg/ha K₂O); evitare suprapășunat și supratârilit sau cosit cel puțin o dată pe an; respectarea, repararea și întreținerea drumului de exploatație;</p> <p>- cu angajament de agromediu: lucrările executate manual; interzis aratul și discuitul; însămânțare cu specii din flora locală; cosit cel puțin o dată pe an; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha.</p>						

CAP.8. REGULAMENTUL DE UTILIZARE ȘI GESTIONARE AL PAJIȘTILOR

„Autoritatea contractanta are obligatia de a include în cadrul documentației de concesiune sau închiriere a pajiștilor amenajamentele pastorale și condiții speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare" (art.6 alin. 2 din HG nr. 1064 din 11/12/2013).

Raportul de monitorizare al pajiștilor — **Ancheta pastorală** trebuie sa fie clară, concisă și să folosească un limbaj accesibil. În elaborarea rapoartelor de monitorizare se va ține cont de faptul ca acestea vor reprezenta argumentele științifice pe baza cărora, factorii de decizie, vor lua deciziile adecvate privind **măsurile de management necesare pentru gestionarea pajiștilor - „Calendarul lucrărilor pe pajiște, în acord cu legislația în vigoare”:**

IANUARIE

Curățirea pajiștilor, respectiv defrișarea vegetației lemnoase în "ferestrele" iernii, dacă vremea o permite. Vegetația nedorită trebuie adunată de pe pajiște.

*Nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări. Se pot face doar în cazul terenurilor degradate și doar cu specii din flora locală.

FEBRUARIE

Acțiuni pe teren:

- continuarea curățirii pajiștilor, respectiv defrișării vegetației lemnoase în "ferestrele" iernii, dacă vremea o permite. Vegetația nedorită trebuie adunată de pe pajiște;
- transportul gunoiului de grajd și aplicarea lui. Utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30 kg azot substanță activă /hectar (a se vedea caietul de Agromediu/APIA); utilizarea pesticidelor și a fertilizanților chimici este interzisă;
- desfundarea canalelor de desecare, acolo unde este cazul, dacă solul nu este acoperit;

*Interzicerea pășunatului, îndeosebi cu oile și caprele, pentru a preveni degradarea solului și răirea prematură a covorului ierbos.

MARTIE

Acțiuni pe teren:

- se continuă defrișarea vegetației lemnoase și adunarea vegetației nedorite;
- împrăștierea mușuroaielor și nivelarea terenului;
- se continuă, unde este cazul, transportul și aplicarea gunoiului de grajd și al amendamentelor;
- eliminarea excesului de umiditate temporară prin canale de desecare și al excesului permanent prin drenaje;
- începe plantarea arborilor pentru eliminarea umidității (unde este cazul - plopi, salcie), umbră la animale sau delimitare tarlale (unde este cazul);
- continuă aplicarea îngrășămintelor chimice după topirea zăpezii (unde este cazul);
- se construiesc sau se refac drumurile de acces pe pășune;
- se verifică sursa de apă în vederea asigurării apei de adăpat pentru animale, din râuri sau fântâni. Se vor realiza: captări, amenajări specifice, puțuri, jgheaburi etc.
- se vor realiza (acolo unde este cazul) construcții ușoare pentru adăpostirea animalelor (tabere de vară). În cazul în care ele există, se va trece la dezinfectarea și repararea acestora. Adăposturile vor fi dimensionate după numărul animalelor iar acolo unde este cazul vor fi prevăzute cu instalații de colectare și distribuție a dejecțiilor și alte utilități.
- se vor repara și dezinfecta stânele, saivanele, etc.

APRILIE

Acțiuni pe teren:

- încheierea acțiunilor de împrăștiere a mușuroaielor, defrișării vegetației lemnoase clunatoare și nivelarea terenului;
- încheierea fertilizării cu gunoi de grajd și aplicarea amendamentelor (dacă este cazul);
- continuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare (eliminarea excesului de umiditate);
- continuarea aplicării îngrășămintelor chimice (dacă este cazul);
- lucrări de supraînsămânțare a pajiștilor cu covor ierbos degradat (acolo unde este cazul);
- eliminarea crengilor uscate la arborii izolați de pe pășuni;
- finalizarea lucrărilor de plantare arbori pentru umbră, împrejmuiri sau desecări biologice (acolo unde este cazul);

- reparații la alimentările cu apă (puțuri, jgheaburi, etc.) podețe, drumuri, garduri de împrejmuire, adăposturi pentru animale, stâni și alte dotări pentru sezonul de pășunat;
- începerea sezonului de pășunat pe pășuni după data de 20 aprilie și respectarea pășunatului pe specii și categorii de animale.

Pășunatul începe când solul e bine zvântat. Pășunile inundate nu trebuie pășunate mai devreme de 2 săptămâni de la retragerea apelor .

*Este interzis aratul și discuitul pajiștilor sub angajament APIA a se vedea Caietul de Agromediu/APIA;

- respectarea încărcăturii optime de animale la hectar.

MAI

• Utilizatorii de pajiști au obligația să respecte încărcătura minimă de animale pe hectar (0,3 UVM). Pășunatul se efectuează cu maxim 1,0 UVM (Unitate Vita Mare) - maxim o bovină la hectar - a se vedea tabele de conversie din Ghidul pentru Fermieri de la APIA.

• Trebuie să se asigure o densitate optimă pe întreaga suprafață (OP x suprafața pajiștii), pentru prevenirea pășunatului excesiv, care conduce la reducerea ratei de refacere a pășunii, scăderea producției de iarbă și a cantității de iarbă consumată de animale în ciclurile următoare de pășunat.

• Planificarea succesiunii de pășunat a tarlalelor (pășunatul continuu) cu respectarea următoarelor criterii:

- conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat. Astfel animalele nu stau în același loc, ci pășunează pe locuri diferite și în aceeași zi și în zile diferite;

- pășunatul în front; animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe pășune de către un cioban ce le permite înaintarea numai pe măsura consumării plantelor;

- pășunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redusă în mod substanțial la 1-2 parcele, delimitate prin bariere naturale (canal, albia unui râu, garduri de arbuști), drumuri, semne convenționale sau prin garduri, cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale de parcelare și alimentare cu apă.

- se respectă pășunatul cu speciile de animale stabilite anterior, pentru a preveni reducerea potențialului productiv al pajiștii și afectarea calității acesteia.

IUNIE

Acțiuni pe teren:

În zona de dealuri joase începe campania de combatere a principalelor buruieni din pajiști, respectiv plantele neconsumate de animale.

Începe recoltarea fânețelor și conservarea furajelor sub formă de siloz, semisiloz și fân, în funcție de regimul pluviometric și dotarea fermelor.

Cositul poate începe doar după data de 1 iulie realizat în etape. Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului; cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia. O bandă necosită sau nepășunată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă poate fi cosită/pășunată după 1 SEPTEMBRIE.

Cositul resturilor neconsumate și imprăștierea dejecțiilor solide, după fiecare ciclu de pășunat/cosit.

Aplicarea fazială a azotului pentru pajiștile care nu sunt sub angajament APIA.

Agricultorii care utilizează pajiști permanente nu trebuie să ardă vegetația, inclusiv iarbă ramasă după cositul pajiștii (GAEC 8), obiectivul acestei condiții fiind menținerea unui nivel minim de întreținere a solului prin protejarea pajiștilor permanente.

Menținerea pajiștilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de pășunat sau cosirea lor cel puțin o dată pe an (GAEC 7).

Respectarea încărcăturii optime de animale la hectar.

Nu este permisă tăierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole (GAEC 9).

Niciun tip de îngrășământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zapadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri înghețate. (Ordin Comun 1182/1270/2005, cerințe pentru zonele vulnerabile la nitrați).

Nu vor fi folosiți fertilizatori în apropierea resurselor de apă, în conformitate cu următoarele indicații:

- fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă;

- fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă;
- în apropierea stațiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit nici un tip de fertilizator la o distanță mai mică de 100 m față de stația de captare a apei.

IULIE

Acțiuni pe teren:

- în zona alpină începe campania de combatere a principalelor buruieni din pajiștile, respectiv plantele neconsumate de animale.
- se continuă recoltarea fânețelor și conservarea furajelor sub formă de siloz, semisiloz și fân, în funcție de regimul pluviometric și dotarea fermelor.
- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața fâneței nu mai tarziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

*Nu se vor efectua lucrări mecanizate pe pajiștile sub angajament APIA

Agricultorii care utilizează pajiști permanente nu trebuie să ardă vegetația, inclusiv iarba rămasă după cositul pajiștii (GAEC 8), obiectivul acestei condiții fiind menținerea unui nivel minim de întreținere a solului prin protejarea pajiștilor permanente.

AUGUST

Cositul resturilor neconsumate și împrăștierea dejecțiilor solide, după fiecare ciclu de pășunat.

Aplicarea fazială a azotului pentru pajiștile care nu sunt sub angajament APIA.

Agricultorii care utilizează pajiști permanente nu trebuie să ardă vegetația, inclusiv iarba rămasă după cositul pajiștii (GAEC 8), obiectivul acestei condiții fiind menținerea unui nivel minim de întreținere a solului prin protejarea pajiștilor permanente.

SEPTEMBRIE

Menținerea pajiștilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de pășunat sau cosirea lor cel puțin odată pe an (GAEC 7).

Nu este permisă tăierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole (GAEC 9).

Niciun tip de îngrășământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri înghețate. (Ordin Comun 1182/1270/2005, cerințe pentru zonele vulnerabile la nitrați).

Nu vor fi folosiți fertilizatori în apropierea resurselor de apă, în conformitate cu următoarele indicații:

- fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă;
- fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă;
- în apropierea stațiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit nici un tip de fertilizator la o distanță mai mică de 100 m față de stația de captare a apei.

Respectarea încărcăturii optime de animale la hectar.

OCTOMBRIE

La sfârșitul lunii animalele se pregătesc să iasă de pe pășune.

NOIEMBRIE

Este interzis a se intra cu animalele în pajiște, plantele din covorul vegetal au nevoie de o perioadă de repaus.

DECEMBRIE

Este interzis a se intra cu animalele în pajiște, plantele din covorul vegetal au nevoie de o perioadă de repaus.

SPECIFICARE:

Se va respecta Codul 214 reprezintă — Masura de Agromediu din Programul National de Dezvoltare Rurala, din cadrul Pilonul 2/Axa 2 GAEC reprezintă— Bune Practici Agricole și de Mediu — SAPS Plățile Directe (pe suprafața) din cadrul Pilonului 1

ATE NȚI E:

UTILIZAREA PESTICIDELOR ȘI A FERTILIZANTILOR CHIMICI ESTE INTERZISĂ ÎN PROGRAMUL DE AGROMEDIU!

Tabel nr.8

Tabelul 8.1

Parcela	Suprafața		Combaterea buruienilor și vegetației lemnoase	Strângerea cioabelor, pietrelor și nivelarea mușuroaielor	Grăpatul pajiștilor		Amendarea pajiștilor		Suprainsămânțarea sau reînsămânțarea pajiștilor		Fertilizarea* pajiștilor	
	Perioada/Anul	Supraf.			Perioada/Anul	Supraf.	Perioada/Anul	Supraf.	Perioada/Anul	Supraf.	Perioada/Anul	Supraf.

*Fertilizarea pajiștilor se va realiza pe baza unui plan de fertilizare anual, ținând cont de cartarea agrochimică

ANEXA

LUCRĂRILE AGRICOLE, AGREGATELE ȘI VOLUMUL CHELTUIELILOR
 pentru diferite variante tehnologice de îmbunătățire a pajiștilor
 prin supraînsămânțare sau reînsămânțare

a. Variante ale tehnologiilor de supraînsămânțare

Condiții staționale	Numărul variantei	Denumirea lucrărilor agricole	Agregat	Preț [lei/ha]	Total [lei/ha]
0	1	2	3	4	5
Pajiștea este invadată de mușuroaie și prezintă microdenivelări	Varianta 1	Curățirea de mușuroaie anuale și aerarea covorului vegetal	Tractor pe roți + Rindea de pajiști	150	610
		Semănatul plantelor furajere de pajiști	Tractor pe roți + Semănătoare	200	
		Tăvălugirea după semănat	Tractor pe roți + Tăvălug inelar	55	
		Diminuarea concurenței vechiului covor vegetal după semănat	Tractor pe roți + Mașină de curățat pajiști	205	
	Varianta 2	Curățirea de mușuroaie anuale și aerarea covorului vegetal și semănatul plantelor furajere de pajiști	Tractor pe roți + Rindea de pajiști + Echipament de semănat	150	410
		Tăvălugirea după semănat	Tractor pe roți + Tăvălug inelar	55	
		Diminuarea concurenței vechiului covor vegetal după semănat	Tractor pe roți + Mașină de curățat pajiști	205	
	Varianta 3	Curățirea de mușuroaie anuale și aerarea covorului vegetal și fertilizarea cu P și K	Tractor pe roți + Rindea de pajiști + Echipament de fertilizat	150	685
		Supraînsămânțarea propriu-zisă	Tractor pe roți + Mașină de supraînsămânțat	330	
		Diminuarea concurenței vechiului covor vegetal după semănat prin curățire și tocare	Tractor pe roți + Mașină de curățat pajiști	205	
	Varianta 4	Curățirea de mușuroaie anuale, de dejecții și aerarea covorului vegetal și fertilizarea cu P și K	Tractor pe roți + Rindea de pajiști + Echipament de fertilizat	150	350
		Supraînsămânțarea propriu-zisă și diminuarea concurenței vechiului covor vegetal prin erbicidare în benzi	Tractor pe roți + Mașină de supraînsămânțat	200	

Pajiștea este invadată de mușuroaie și vegetație lemnoasă nevaloroasă cu diametrul sub 4 cm	Varianta 1	Curățirea de mușuroaie și de vegetația nevaloroasă	Tractor pe roți + Mașină de curățat pajiști	205	815
		Pregătirea superficială a terenului	Tractor pe roți + Rindea de pajiști	150	
		Semănatul plantelor furajere de pajiști	Tractor pe roți + Semănătoare	200	
		Tăvălugirea după semănat	Tractor pe roți + Tăvălug inelar	55	
		Diminuarea concurenței vechiului covor vegetal după semănat	Tractor pe roți + Mașină de curățat pajiști	205	
	Varianta 2	Curățirea de mușuroaie, de vegetația nevaloroasă și fertilizarea cu P și K	Tractor pe roți + Rindea de pajiști + Echipament de fertilizat frontal	150	685
		Supraînsămânțarea propriu-zisă	Tractor pe roți + Mașină de supraînsămânțat	330	
		Diminuarea concurenței vechiului covor vegetal după semănat prin curățire și tocare	Tractor pe roți + Mașină de curățat pajiști	205	
	Varianta 3	Curățirea de mușuroaie, de vegetația nevaloroasă și fertilizarea cu P și K	Tractor pe roți + Rindea de pajiști + Echipament de fertilizat frontal	150	355
		Supraînsămânțarea propriu-zisă și diminuarea concurenței vechiului covor vegetal prin erbicidare în benzi	Tractor pe roți + Mașină de supraînsămânțat	205	

b. Variante ale tehnologiilor de reînsămânțare

	Lucrare	Agregat	Pret [lei/ha]	Total [lei/ha]
0	1	2	3	4
a. Pajiști degradate cu strat de sol profund și felina subțire				
Varianta 1 - Clasică	Administrat amendamente pe pajiști cu soluri acide	Tractor pe roți + Mașină de administrat amendamente	390	1.050...1.290
	Distrugerea vechiului covor vegetal prin desțelenire	Tractor pe roți + Plug reversibil	440	
		Tractor pe roți + Grapă cu discuri grea	230	
	Administrat îngrășăminte minerale	Tractor pe roți + Mașină de îngrășăminte chimice	60	
	Pregătirea patului germinativ	Tractor pe roți + Combinator de pregătit pat germinativ	100	
		Tractor pe roți + Grapă cu discuri	130	

0	1	2	3	4
	Tăvălugitul înainte de semănat	Tractor pe roți + Tăvălug inelar	55	
	Semănatul plantelor furajere de pașiști	Tractor pe roți + Semănătoare de cereale	160	
	Tăvălugitul după semănat	Tractor pe roți + Tăvălug inelar	55	
Varianta 2 - Mașini specifice de semănat	Curățirea de mușuroaie și vegetație nevaloroasă	Tractor pe roți + Mașină de curățat pașiști	205	1.805
	Administrat amendamente pe pașiști cu soluri acide	Tractor pe roți + Mașină de administrat amendamente	390	
	Arat la 20-22 cm	Tractor pe roți + Plug reversibil	440	
	Pregătire pat germinativ	Tractor pe roți + Grapa rotativă	420	
	Fertilizare cu îngrășăminte chimice, semănat și tăvălugit înainte și după semănat	Tractor pe roți + Mașina de semănat + Echipament de fertilizat	350	
	Curățirea de mușuroaie și vegetație nevaloroasă	Tractor pe roți + Mașină de curățat pașiști	205	
Administrat amendamente pe pașiști cu soluri acide	Tractor pe roți + Mașină de administrat amendamente	390		
Fertilizare cu îngrășăminte chimice, distrugerea vechiului covor vegetal, pregătirea patului germinativ, semănatul plantelor furajere de pașiști și tăvălugirea după semănat	Tractor pe roți + Mașina combinată îmbunătățită de distrus vechiul covor vegetal, pregătit patul germinativ, semănat și tăvălugit + Echipament de fertilizat	700		
b. Pașiști degradate cu strat de sol profund și țelina groasă				
Varianta 1 - Clasică, cu plug	Curățirea de mușuroaie și de vegetație nevaloroasă	Tractor pe roți + Mașină de curățat pașiști	205	1.595...1.625
	Administrat amendamente pe pașiști cu soluri acide	Tractor pe roți + Mașină de administrat amendamente	390	
	Discuitul țelinii	Tractor pe roți + Grapă cu discuri	130	
	Distrugerea vechiului covor vegetal prin desțelenire	Tractor pe roți + Plug reversibil	440	
	Administrat îngrășăminte minerale	Tractor pe roți + Mașină de îngrășăminte chimice	60	
	Pregătirea patului germinativ	Tractor pe roți + Combinator de pregătit pat germinativ	100	
		Tractor pe roți + Grapă cu discuri	130	

)

)

0	1	2	3	4
c. Pajiști degradate cu strat de sol subțire și țelina groasă				
Varianta 1 – Clasică, cu freză agricolă	Curățirea de mușuroaie și vegetație nevaloroasă	Tractor pe roți + Mașină de curățat pajiști	205	2.025
	Administrat amendamente pe pajiști cu soluri acide	Tractor pe roți + Mașină de administrat amendamente	390	
	Distrugerea vechii țelini și pregătirea patului germinativ	Tractor pe roți + Freză prelucrat total (două treceri perpendiculare)	1.100	
	Administrat îngrășăminte minerale	Tractor pe roți + Mașină de îngrășăminte chimice	60	
	Tăvălugitul înainte de semănat	Tractor pe roți + Tăvălug inelar	55	
	Semănatul plantelor furajere de pajiști	Tractor pe roți + Semănătoare de cereale	160	
	Tăvălugitul după semănat	Tractor pe roți + Tăvălug inelar	55	
Varianta 2 – Mașini combinate	Curățirea de mușuroaie și vegetație nevaloroasă	Tractor pe roți + Mașină de curățat pajiști	205	1.995
	Administrat amendamente pe pajiști cu soluri acide	Tractor pe roți + Mașină de administrat amendamente	390	
	Fertilizare cu îngrășăminte chimice, distrugerea vechiului covor vegetal, pregătirea patului germinativ, semănatul plantelor furajere de pajiști și tăvălugirea după semănat	Tractor pe roți + Mașina combinată îmbunătățită de distrus vechiul covor vegetal, pregătit patul germinativ, semănat și tăvălugit (două treceri perpendiculare)	1.400	
d. Pajiști degradate cu strat de sol subțire și țelina subțire				
Varianta 1 – Clasică, cu grapă cu discuri	Administrat amendamente pe pajiști cu soluri acide	Tractor pe roți + Mașină de administrat amendamente	390	1.080
	Distrugerea vechii țelini	Tractor pe roți + Grapă cu discuri grea	230	
	Administrat îngrășăminte minerale	Tractor pe roți + Mașină de îngrășăminte chimice	60	
	Pregătirea patului germinativ	Tractor pe roți + Grapă cu discuri	130	
	Tăvălugitul înainte de semănat	Tractor pe roți + Tăvălug inelar	55	
	Semănatul plantelor furajere de pajiști	Tractor pe roți + Semănătoare de cereale	160	
	Tăvălugitul după semănat	Tractor pe roți + Tăvălug inelar	55	

0	1	2	3	4
	Tăvălugitul înainte de semănat	Tractor pe roți + Tăvălug inelar	55	
	Semănatul plantelor furajere de pajiști	Tractor pe roți + Semănătoare de cereale	160	
	Tăvălugitul după semănat	Tractor pe roți + Tăvălug inelar	55	
Varianta 2 – Clasică, cu freză	Curățirea de mușuroaie și de vegetație nevalorosă	Tractor pe roți + Mașină de curățat pajiști	205	2.025
	Administrat amendamente pe pajiști cu soluri acide	Tractor pe roți + Mașină de administrat amendamente	390	
	Distrușterea vechii țelini și pregătirea patului germinativ	Tractor pe roți + Freză prelucrat total (două treceri perpendiculare)	1.100	
	Administrat îngrășăminte minerale	Tractor pe roți + Mașină de îngrășăminte chimice	60	
	Tăvălugitul înainte de semănat	Tractor pe roți + Tăvălug inelar	55	
	Semănatul plantelor furajere de pajiști	Tractor pe roți + Semănătoare de cereale	160	
	Tăvălugitul după semănat	Tractor pe roți + Tăvălug inelar	55	
Varianta 3 – Mașini specifice de semănat	Curățire de mușuroaie și vegetație nevalorosă	Tractor pe roți + Mașină de curățat pajiști	205	1.825
	Administrat amendamente pe pajiști cu soluri acide	Tractor pe roți + Mașină de administrat amendamente	390	
	Dezmiriștit	Tractor pe roți + Grapa cu discuri (două treceri perpendiculare)	460	
	Pregătire pat germinativ	Tractor pe roți + Grapă rotativă	420	
	Fertilizare cu îngrășăminte chimice, semănat și tăvălugit înainte și după semănat	Tractor pe roți + Mașină de semănat + Echipament de fertilizat	350	
Varianta 4 – Mașini combinate	Curățirea de mușuroaie și vegetație nevalorosă	Tractor pe roți + Mașină de curățat pajiști	205	1.995
	Administrat amendamente pe pajiști cu soluri acide	Tractor pe roți + Mașină de administrat amendamente	390	
	Fertilizare cu îngrășăminte chimice, distrușterea vechiului covor vegetal, pregătirea patului germinativ, semănatul plantelor furajere de pajiști și tăvălugirea după semănat	Tractor pe roți + Mașina combinată îmbunătățită de distrușterea vechiului covor vegetal, pregătirea patului germinativ, semănat și tăvălugit (două treceri perpendiculare)	1.400	

0	1	2	3	4
Varianta 2 – Mașini combinate	Curățirea de mușuroaie și vegetație nevaloroasă	Tractor pe roți + Mașină de curățat pajiști	205	1.995
	Administrat amendamente pe pajiști cu soluri acide	Tractor pe roți + Mașină de administrat amendamente	390	
	Fertilizare cu îngrășăminte chimice, distrugerea vechiului covor vegetal, pregătirea patului germinativ, semănatul plantelor furajere de pajiști și tăvălugirea după semănat	Tractor pe roți + Mașina combinată îmbunătățită de distrus vechiul covor vegetal, pregătīt patul germinativ, semănat și tăvălugit (două treceri perpendiculare)	1.400	

Notă: Prețurile lucrărilor sunt valabile pentru 1 Euro = 4,5 lei, la data de 01.10.2014.



Fertilizatul, tăvălugitul înainte de semănat, semănatul și tăvălugitul după semănat, utilizând mașini și echipamente specifice.



CAP. 9 BIBLIOGRAFIE

- Andreea C. ANDREOIU, Vasile A. BLAJ, Cosmin S. CONSTANTINESCU, Marcela M. DRAGOȘ, Tudor A. ENE, Tudor A. ENE, Emil C. HAȘ, Emil ICHIM, Teodor MARUȘCA, Vasile MOCANU, Doina SILISTRU, Monica A. TOD, Sorin V. TOD, Paul M. ZEVEDEI, 2014. **Ghid de întocmire a Ameneajamentelor Pastorale**, Ed. Capolavoro, Brașov.
- Maria SCHITEA, Teodor MARUȘCA, Doina SILISTRU, Monica TOD, 2011. **Principalele soiuri de graminee și leguminoase perene de pajiști**, Ed. Capolavoro, Brașov.
- I. IONESCU, M. OSICEANU, 2009. **Cultura pajiștilor și a plantelor furajere**, Ed. Sitech, Craiova.
- Al. MOISUC, Gh. MOTCA, I. ROTARU, V. VINTU, 2004. **Cultura pajiștilor și a plantelor furajere**, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iași.
- I. ROTAR, Roxana VIDICAN, 2003. **Cultura pajiștilor**, Ed. Polirom, Cluj Napoca.
- I. IONESCU, 2003. **Cultura pajiștilor**, Ed. Sitech, Craiova.
- Teodor MARUȘCA, 1978. **Îmbunătățirea prin reînsămânțare a pajiștilor degradate**, MAIA, Redacția de Propagandă Tehnică Agricolă, București.
- Gh. BOLDEA, V. CARDASOL, Șt. CRĂCIUN, N. SIMTEA, 1990. **Reînsămânțarea și supraînsămânțarea pajiștilor**, Întreprinderea Poligrafică Deva.
- Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Sibiu, 2016. **Studiul Pedologic și agrochimic, Clase de calitate, Note de bonitare și aprovizionarea cu nutrienți**, Teritoriul Poplaca.
- Ordonanța de urgență a Guvernului – OUG nr. 34/2013** privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
- Ordin nr. 544/2013** privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
- Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013** privind Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013.
- Hotărârea Guvernului nr. 78/2015** privind completarea și modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013.
- Hotărârea Guvernului nr. 214/2017** pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013.
- Hotărârea nr. 643/2017** privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013
- Legea nr. 44/2018** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

CAP. 10

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A AMENAJAMENTULUI; DURATA ACESTUIA

Prezentul Amenajament pastoral intră în vigoare la data de: 01.06.2018.
Durata amenajamentului pastoral este de 10 ani.

10.1. COLECTIVUL DE ELABORARE A PREZENTEI LUCRĂRI

Primăria Cisnădie:

-ing. CREȚOIU Cristian – Consilier superior

- ing. BUTURE Ioan – Consilier superior

- SIMINA Ioan – Referent de specialitate

Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu:

- ing. VLĂDUȚ ANA-MARIA – Consilier superior

10.2 HĂRȚILE CE SE ATAȘEAZĂ AMENAJAMENTULUI


Planul topografic de bază este "PLAN DE SITUAȚIE PENTRU CADASTRU FUNCİAR", scara 1:5000, întocmite de O.C.O.T.A. în anul 1985. Este compus din 8 secțiuni, atașate la prezenta lucrare.

10.3 EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ANUAL PE FIECARE PARCELĂ

Lucrările efectuate în fiecare an pe fiecare parcelă, se vor nota într-un tabel conform cu modelulului alăturat (Tabelul 9.6), care se va atașa la Amenajament. Va cuprinde date din caietul de lucrări specific fiecărui Amenajament pastoral.
De asemenea, este atașat și "Regulamentul de utilizare și gestionare al pajiștilor", pentru pajiștile proprietate privată ale orașului Cisnădie.

Acest Amenajament Pastoral al Pajiștilor permanete amplasate pe raza U.A.T. Cisnădie a fost aprobat în ședința Consiliului Local Cisnădie Nr. 136 din 24 mai 2018

Președinte de ședință,
COSMIN-ARON BOBEANU



Contrasemnează:
Secretar d.,
DANIELA SZASZ



